

唇瓣色淡或有时带白色或淡黄色，侧裂片上有紫纹，中裂片上有紫色斑；萼片线形至宽线形，长1.8—3.5厘米，宽4—7毫米；花瓣狭卵形，长1.6—2.6厘米，宽5.5—8.5毫米；唇瓣卵形，长1.4—2.2厘米，稍3裂；侧裂片上有小乳突或细小的短柔毛；中裂片强烈外弯，前部疏生小乳突，近全缘；唇盘上2条纵褶片从近基部处向上延伸到中裂片基部，上部略向内倾斜；蕊柱长1.1—1.5厘米，稍向前弯曲，两侧有狭翅；花粉团4个，成2对。蒴果狭椭圆形，长5—6厘米，宽约2厘米。花期10月至次年2月。

产广东、海南、广西南部、贵州西南部、云南东南部（蒙自、砚山、麻栗坡、屏边）。生于林下排水良好、多石之地或岩石缝中，海拔900—1600米。尼泊尔、不丹、印度、缅甸、泰国、越南、柬埔寨、菲律宾也有分布。模式标本采自不丹。

Du Puy et Cribb 在《The Genus Cymbidium》(1988) 中将本种分为两个亚种：原亚种产尼泊尔、不丹、印度东北部以及中国南部(?) (叶长50—90厘米，花苞片长18—35(—43)毫米，花瓣比萼片宽，萼片与花瓣绿色并在基部中脉有红棕色斑点)；新亚种(subsp. *indochinese*) 产缅甸、泰国、柬埔寨、菲律宾(叶长32—51厘米，花苞片长3—22(—25)毫米，花瓣等宽于或狭于萼片，萼片与花瓣淡黄色并有5—7条红棕色纵脉)。中国植物的特征似乎介于两者之间，但从地理分布上看应更接近后者。由于我们所看到的标本大都没有花朵，难以作出确切的判断，而且这两个亚种是否有区分的必要仍然有不同的看法。这时仍遵从传统的看法，作为一个种处理。

25. 蕙兰

Cymbidium faberi Rolfe in Kew Bull. 198. 1896; 中国高等植物图鉴 5: 745. 图 8320. 1976; 秦岭植物志 1: 432. 图 421. 1976; 台湾兰科植物 2: 109—110 (图). 1977; 台湾植物志 5: 942. 1978; Y. S. Wu et S. C. Chen in Acta Phytotax Sin. 18 (3): 299. fig. 2 (9). 1980; Du Puy et Cribb, Genus Cymbidium 177. Phot. 130. fig. 30 (2). 1988; 安徽植物志 5: 544. 图 308. 1992; 浙江植物志 7: 524. 图 7—700. 1993; 中国兰花 (第二版) 42. 1993; 横断山区维管植物 2: 2600. 1994; 福建植物志 6: 616. 图 538. 1995; 中国兰花全书 93. 图 5—20. 1998. ——*Cymbidium scabroserrulatum* Makino in Bot. Mag. Tokyo 16: 154. 1902. ——*Cymbidium oiwakensis* Hayata, Icon. Pl. Formos. 6: 80. fig. 14. 1916. ——*Cymbidium crinum* Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. 12: 350. 1922. ——*Cymbidium fukienense* T. K. Yen, Icon. Cymbid. Amoyens. A. 1. figs. 1964. ——*Cymbidium faberi* Rolfe f. *viridiflorum* S. S. Ying in Mem. Coll. Agric. Nat. Taiwan Univ. 30 (1): 41. 1990.

25a. 蕙兰 (原变种) 图版 37: 4—5

var. *faberi*

地生草本；假鳞茎不明显。叶5—8枚，带形，直立性强，长25—80厘米，宽