

片中部, 褶片在中裂片上呈平直的片状, 中央的褶片较长

..... 10. 南方带唇兰 *T. ruybarrettoi* (S. Y. Hu et Barretto) Z. H. Tsi

5. 花褐绿色或紫褐色; 唇瓣中裂片在中部以下不明显收狭; 唇盘在两侧裂片之间常具3条
(罕有5条的) 褶片, 但延伸到中裂片上骤然隆起为5条波状或鸡冠状的等长褶片

..... 11. 高褶带唇兰 *T. viridifusca* (Hook.) Benth. et Hook. f.

1. 假鳞茎圆柱形或狭长圆柱形。

6. 叶椭圆形或宽卵形, 不具折扇状脉。

7. 假鳞茎直立或斜立; 叶宽卵形, 质地厚, 近肉质, 无柄

..... 1. 卵叶带唇兰 *T. ovifolia* Z. H. Tsi et S. C. Chen

7. 假鳞茎细圆柱形, 多少弧曲上举; 叶椭圆形, 纸质, 明显具柄。

8. 唇瓣不裂, 卵状披针形 2. 峨眉带唇兰 *T. emeiensis* (K. Y. Lang) Z. H. Tsi

8. 唇瓣在前部3裂; 侧裂片很小, 三角形, 稍钝; 中裂片卵状三角形, 先端急尖

..... 3. 大花带唇兰 *T. macrantha* Hook. f.

6. 叶披针形、长圆形或椭圆形, 具折扇状脉。

9. 唇瓣中裂片横长圆形或扁圆形, 先端近截形或凹陷并常具1个短尖

..... 4. 带唇兰 *T. dunnii* Rolfe

9. 唇瓣中裂片倒卵形或近圆形, 先端钝或微凹。

10. 唇盘自基部至中裂片近先端处纵贯3条褶片

..... 5. 阔叶带唇兰 *T. latifolia* (Lindl.) Rehb. f.

10. 唇盘在两侧裂片之间具3条褶片, 而在中裂片上具4—5条褶片

..... 6. 滇南带唇兰 *T. minor* Hook. f.

1. 卵叶带唇兰 (植物分类学报)

Tainia ovifolia Z. H. Tsi et S. C. Chen in Acta Phytotax. Sin. **32** (6): 558.
fig. 2 (14—15). 1994.

假鳞茎聚生, 淡紫色, 长卵形, 长4厘米, 基部粗1.5厘米, 顶生1枚叶。叶近肉质或厚革质, 上面深绿色, 背面紫色, 宽卵形, 长4.5—7厘米, 基部上方宽3—5厘米, 先端急尖, 基部圆形, 具长约3毫米的柄。花萼侧生于假鳞茎的基部, 直立, 长1.8厘米, 粗2—3毫米, 近中部具1枚膜质筒状鞘; 总状花序具4—5朵花; 花苞片狭披针形, 长约1厘米, 先端渐尖; 花梗和子房长1厘米; 花黄绿色; 中萼片披针形, 长1.2厘米, 宽2毫米, 先端长渐尖, 具3条脉; 侧萼片与中萼片相似, 基部贴生于蕊柱足上而形成明显的萼囊; 花瓣与萼片同形, 长1.2厘米, 宽1.2毫米, 先端急尖, 具3—4条脉; 唇瓣倒卵形, 长约1厘米, 近中部3裂; 侧裂片较小, 卵状三角形, 两侧裂片先端之间相距7毫米, 先端急尖; 中裂片倒卵形, 宽6毫米, 先端具短尖; 唇盘具3条褶片, 中央1条较小; 蕊柱长4毫米; 蕊柱足长0.4毫米。 花期3月。

产云南南部(勐腊)。生于海拔1150米的常绿阔叶林下的岩石边。(模式标本产地)

2. 峨眉带唇兰 (新拟) 峨眉球柄兰 (植物分类学报)