

本种广布于长江以南各省区，花的颜色和唇瓣中裂片先端的形状常有变化。

5. 阔叶带唇兰 (中国高等植物图鉴) 竹东杜鹃兰 (台湾植物志), 大花邓兰 (海南植物志), 圆叶小杜鹃兰 (台湾兰科彩色图鉴)

*Tainia latifolia* (Lindl.) Rchb. f. in Bonpl. 5: 54. 1857; Benth. ex Hook. f., Fl. Brit. Ind. 5: 820. 1890; King et Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calcutta 8: 103. pl. 142. 1898; 海南植物志 4: 215. 图 1099. 1977; Seidenf. in Opera Bot. 89: 35. fig. 15. 1986, et 114: 79. 1992; Averyanov, Vasc. Pl. Syn. Vietnam. Fl. 1: 155. 1990; H. Turner in Orch. Monog. 6: 78. 1992; Averyanov, Iden. Guide Vietnam. Orch. 92. 1994; 中国兰花全书 52. 1998. — *Ania latifolia* Lindl. Gen. Sp. Orch. Pl. 130. 1831.

假鳞茎彼此靠近，圆柱状长卵形，长约 7 厘米，基部粗 1—1.5 厘米，被膜质鞘，顶生 1 枚叶。叶纸质，椭圆形或椭圆状披针形，长 18—32 厘米，宽 5—7 厘米，先端渐尖，基部收狭为柄，具 3 条较明显的脉；叶柄纤细，长 8—30 厘米。花葶生于假鳞茎基部，直立，长 20—80 厘米，具 3 枚筒状膜质鞘，鞘长 5—8 厘米；总状花序长达 20 厘米；花序轴深褐色，疏生多数花；花苞片小，狭披针形，长约 2 毫米；花梗和子房近直立，深褐色，长约 1.3 厘米；子房膨大，呈棒状；花具香气，萼片和花瓣深褐色；中萼片狭长圆形，长 1.1—1.35 厘米，宽 1.7—2 毫米，先端钝，具 3 条脉；侧萼片与中萼片近等大，狭镰刀状长圆形，基部贴生在蕊柱足上；萼囊短钝；花瓣近似侧萼片，但较宽，先端近急尖，具 3 条脉；唇瓣黄色，倒卵形，长 8 毫米，上部 3 裂；侧萼片直立，卵状三角形，先端急尖并且稍向前弯，摊平后两侧裂片先端之间相距 5—7 毫米；中裂片近圆形或倒卵形，宽约 4 毫米，先端稍有凹缺；唇盘从基部向中裂片先端纵贯 3 条褶片，中央的 1 条较窄，两侧的较宽，呈弧形；蕊柱黄色，向前弯曲，长约 7 毫米，上端扩大，基部具长约 2 毫米的蕊柱足；药帽顶端两侧各具 1 个紫红色附属物。花期 3 月。

产海南 (白沙) 和云南南部 (思茅)。生于山坡林下。也分布于锡金、不丹、印度东北部、缅甸、泰国、老挝和越南。模式标本采自印度东北部。

6. 滇南带唇兰 (中国兰花全书) 图版 40: 6

*Tainia minor* Hook. f., Fl. Brit. Ind. 5: 821. 1890, et in Hook., Icon. Pl. 21: t. 2091. 1891; King et Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calcutta 8: 102. pl. 141. 1889; H. Turner in Orch. Monogr. 6: 84. fig. 49. 1992; 中国兰花全书 52. 1998.

假鳞茎斜生于根状茎上，彼此靠近，圆柱状长卵形，被膜质筒状鞘，顶生 1 枚叶。叶长圆形，长 18—20 厘米，宽 5—5.5 厘米，先端急尖，基部楔形或近圆形，具 3 条脉；叶柄纤细，长 7—8 厘米。花葶直立，远长于叶；花序轴淡紫褐色，疏生少数花；花苞片狭卵状披针形，长 3—5 毫米；花梗和子房淡紫褐色，比花苞片短；花近直立，