

2. 苞舌兰 (中国高等植物图鉴) 图版 44: 3—4


Spathoglottis pubescens Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. 120. 1831, et in Bot. Reg. 8 (n. s.): sub. t. 19. 1845; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 5: 814. 1890; Rolfe in J. Linn. Soc. Bot. 36: 18. 1903; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1358. 1936; 中国高等植物图鉴 5: 727. 图 8283. 1976; S. Y. Hu, Gen. Orch. Hong Kong 75, fig. 38. 1977; Seidenf. in Opera Bot. 89: 60, fig. 29. 1987, et 114: 88. 1992; Averyanov, Vasc. Pl. Syn. Vietnam. Fl. 1: 152. 1990; 浙江植物志 7: 536. 1993; Averyanov, Iden. Guide Vietnam. Orch. 96. 1994; 福建植物志 6: 608. 图 529. 1995; Z. H. Tsi, S. C. Chen et K. Mori, Wild Orch. China: 112, pl. 270. 1997. — *Spathoglottis fortunei* Lindl. in Bot. Reg. 8 (n. s.): t. 19. 1845; Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. 4: 244. 1919; S. Y. Hu, Gen. Orch. Hong Kong 71. 1977. — *Eulophia sinensis* auct. non Bl.: Guill. in Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris) sér. 2, 31 (1): 116. 1960.

假鳞茎扁球形，通常粗 1—2.5 厘米，被革质鳞片状鞘，顶生 1—3 枚叶。叶带状或狭披针形，长达 43 厘米，宽 1—1.7(—4.5) 厘米，先端渐尖，基部收窄为细柄，两面无毛。花葶纤细或粗壮，长达 50 厘米，密布柔毛，下部被数枚紧抱于花序柄的筒状鞘；总状花序长 2—9 厘米，疏生 2—8 朵花；花苞片披针形或卵状披针形，长 5—9 毫米，被柔毛；花梗和子房长 2—2.5 厘米，密布柔毛；花黄色；萼片椭圆形，通常长 12—17 毫米，宽 5—7 毫米，先端稍钝或锐尖，具 7 条脉，背面被柔毛；花瓣宽长圆形，与萼片等长，宽 9—10 毫米，先端钝，具 5—6 条主脉，外侧的主脉分枝，两面无毛；唇瓣约等长于花瓣，3 裂；侧裂片直立，镰刀状长圆形，长约为宽的 2 倍，先端圆形或截形，两侧裂片之间凹陷而呈囊状；中裂片倒卵状楔形，长约 1.3 厘米，先端近截形并有凹缺，基部具爪；爪短而宽，上面具一对半圆形的、肥厚的附属物，基部两侧有时各具 1 枚稍凸起的钝齿；唇盘上具 3 条纵向的龙骨脊，其中央 1 条隆起而成肉质的褶片；蕊柱长 8—10 毫米；蕊喙近圆形。 花期 7—10 月。

产浙江 (龙泉)、江西 (武功山、安福、井冈山、寻乌、石城)、福建 (平和、龙岩、上杭、永定、连城、泰宁、长汀)、湖南 (宜章、黔阳)、广东 (汕头、梅县、乳源、信宜、罗浮山、英德、肇庆等地)、香港、广西 (融水、龙胜、贺县、金秀等地)、四川 (乐山、天全、马边、布拖、米易、峨眉山、峨边等地)、贵州 (盘县、兴仁、兴义、梵净山等地) 和云南 (蒙自、勐海、思茅)。生于海拔 380—1700 米的山坡草丛中或疏林下。也分布于印度东北部、缅甸、柬埔寨、越南、老挝和泰国。模式标本采自印度东北部。

3. 少花苞舌兰 (西藏植物志) 图版 44: 1—2

Spathoglottis ixoides (D. Don) Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl. 120. 1831; Hook.



图版 44 1—2. 少花苞舌兰 *Spathoglottis ixoides* (D. Don) Lindl. : 1. 植株, 2. 中萼片、花瓣、侧萼片、唇瓣
和蕊柱。3—4. 苞舌兰 *S. pubescens* Lindl. : 唇瓣。(王金凤绘)