

产云南南部(思茅、普文)。生于岩石上,海拔1300米。越南、老挝、缅甸、泰国也有分布。模式标本采自缅甸。

1995年我们曾报道在云南西双版纳采到 *Coclogyne fuscescens* (见上面引证),所依据的标本(Tsi 91-691)是采自普文,十分靠近思茅。此标本唇瓣上的3条纵脊无乳突,且中央的1条呈不规则的褶片状,与 *C. fuscescens* 及其变种 *var. brunnea* 不尽相同。但由于缺乏足够的标本进行比较,而且这个复合体(包括 *C. assamica*)分布广而且界限不清,故仍暂时归入本变种。最早报道本变种产于我国的是基于采自思茅的1份标本(Henry 12964)。后来,Seidenfaden [Dansk Bot. Ark. 29 (4): 32. 1975] 认为应归入 *C. assamica*。但这3个实体的区别太细微了,令人难以区分。或许它们应视为同一个种更为合理。这里仅作权宜处理而已。

8. 疏茎贝母兰(植物分类学报)

Coelogyne suaveolens (Lindl.) Hook. f., Fl. Brit. Ind. 5: 832. 1890; Pfitz. et Kraenzl. in Engler's Pflanzenreich IV (50) Heft 32: 55. fig. 18 (m, n). 1907; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. 29 (4): 52. fig. 19. 1975; Z. H. Tsi et S. C. Chen in Acta Phytotax. Sin. 33 (3): 290. 1995. ——*Pholidota suaveolens* Lindl. in Gard. Chron. 372. 1856.

根状茎粗壮,粗达1厘米,密被褐色、鳞片状鞘。假鳞茎疏离,相距达6厘米,狭卵形或长圆状狭卵形,长5.7—7厘米,粗约1.5厘米,干后略有光泽,外面为巨大的鞘所包,老时鞘脱落,顶端生2枚叶。叶倒披针形或长圆状倒披针形,长30—38厘米,宽5.5—6厘米,厚纸质,先端渐尖,基部收狭为柄;叶柄长9—11厘米。花萼连同幼嫩的假鳞茎和叶从靠近老假鳞茎基部的根状茎上发出,长约20厘米,初时大部分为鞘所包,仅伸出花序;总状花序长约10厘米,通常具10余朵花;花序轴左右曲折;花苞片长圆状卵形,纸质,多少舟状,长约2厘米,脱落;花梗和子房长1.5—1.7厘米;花白色,唇瓣上有黄斑;萼片近长圆形,长约1.2厘米,宽4—4.5毫米,先端渐尖,具5脉;花瓣长圆状披针形或狭卵状长圆形,与萼片等长,宽约3.5毫米;唇瓣近长圆形,长约1厘米,在近中部或中部上方缢缩成前后唇或稍3裂;侧裂片很小或不明显;中裂片长圆状卵形,上面有4—5条纵褶片,从中裂片中部延伸至唇盘(或后唇)上部;纵褶片明显皱波状;蕊柱长5—6毫米,两侧边缘有狭翅。花期5月。

产云南南部(勐腊)。生于常绿阔叶林下岩石上,海拔600米。印度、泰国也有分布。模式标本采自印度。

9. 麻栗坡贝母兰(植物研究) 图版 58: 4—6

Coelogyne malipoensis Z. H. Tsi in Bull. Bot. Res. 15 (1): 43. fig. 1. 1995.

根状茎粗壮,坚硬,粗5—6毫米,密被褐色、鳞片状鞘。假鳞茎在根状茎上相距1.2—1.8厘米,狭长圆形,向上稍狭,长3.5—4厘米,粗8—11毫米,干后无光泽而