

月，果期 11 月。

产云南西北部（高黎贡山）和西藏东南部至南部（察隅、墨脱、波密、林芝、定结）。生于林中树干上或沟谷旁岩石上，海拔 1900—2400 米。锡金、不丹、缅甸也有分布。模式标本采自锡金。

12. 眼斑贝母兰（西藏植物志） 图版 58: 1


Coelogyne corymbosa Lindl., Fol. Orch. Coelogyne 7. 1854; Hook. f. in Curtis's Bot. Mag. **113**: t. 6955. 1887, et Fl. Brit. Ind. **5**: 831. 1890; Rolfe in J. Linn. Soc. Bot. **36**: 22. 1903; Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. **4**: 183. 1919; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **25** (3, 4): 222. 1972; 西藏植物志 **5**: 859. 1987; 横断山区维管植物 **2**: 2574. 1994; 中国兰花全书 198. 图 6-20 (9, 10). 1998. ——*Pleione corymbosa* (Lindl.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. **2**: 680. 1891. ——*Coelogyne taronensis* Hand.-Mazz. in Anzeig. Akad. Wiss. Wien Nath.-Naturw. Kl. **59**: 254. 1922, et Symb. Sinic. **7**: 1347. t. 42. 1936. ——*Coelogyne punctulata* auct. non Lindl.; 中国高等植物图鉴 **5**: 687. 图 8203. 1976.

根状茎较坚硬，粗 3—4 毫米，密被褐色鳞片状鞘。假鳞茎较密集，彼此相距不到 1 厘米，长圆状卵形或近菱状长圆形，长 (1—) 2—4.5 厘米，粗 6—13 毫米，干后亮黄色或棕黄色并强烈皱缩，顶端生 2 枚叶，基部具数枚鞘；鞘纸质，卵形，有光泽，长 1.5—2.5 厘米。叶长圆状倒披针形至倒卵状长圆形，近革质，长 4.5—15 厘米，宽 1—3 厘米，先端通常渐尖，上面可见浮凸的横脉；叶柄长 1—2 厘米。花葶连同幼嫩假鳞茎和叶从靠近老假鳞茎基部的根状茎上发出，长 7—15 厘米（在果期不断延长），中部以下为鞘所包；总状花序具 2—3 (—4) 朵花；花苞片早落；花白色或稍带黄绿色，但唇瓣上有 4 个黄色、围以橙红色的眼斑；萼片长圆状披针形，长 1.8—2.2 (—3.5) 厘米，宽 7—8 毫米，先端急尖或钝；侧萼片略狭于中萼片；花瓣与萼片等长，但宽度仅 2.5—4 毫米；唇瓣近卵形，长 1.6—2.8 厘米，宽 1.2—2.5 厘米，3 裂；侧裂片半圆形或近半卵形，直立；中裂片卵形或卵状披针形，长 6—9 毫米；唇盘上有 2—3 条脊，从基部延伸至中裂片下部；蕊柱稍向前弯曲，长 1—2 厘米，两侧边缘具翅；翅自下向上渐宽，上部一侧宽约 1.7 毫米，顶端钝。蒴果近倒卵形，略带三棱，长 2.2—5 厘米，粗 9—13 毫米。花期 5—7 月，果期次年 7—11 月。

产云南西北部至东南部和西藏南部（聂拉木、亚东、定结、墨脱）。生于林缘树干上或湿润岩壁上，海拔 1300—3100 米。尼泊尔、不丹、锡金、印度和缅甸也有分布。模式标本采自锡金。

13. 密茎贝母兰（新拟）

Coelogyne nitida (Wall. ex D. Don) Lindl., Coll. Bot. sub. t. 33. 1821, non (Roxb.) Hook. f. (1890); Finet in Bull. Soc. Bot. France **45**: 412. 1898; S. Y.



图版 58 1. 眼斑贝母兰 *Coelogyne corymbosa* Lindl. : 带果的植株。2—3. 卵叶贝母兰 *C. occultata* Hook. f. : 2. 植株, 3. 唇瓣。4—6. 麻栗坡贝母兰 *C. malipoensis* Z. H. Tsi: 4. 植株, 5. 唇瓣, 6. 蕊柱。(蔡淑琴绘)