

锡金、印度、缅甸、老挝、柬埔寨、越南、泰国和马来西亚也有分布。模式标本采自缅甸。

2. 小叶毛兰 (新拟) 毛叶毛兰 (中国高等植物图鉴)

Eria microphylla (Bl.) Bl., Mus. Bot. Lugd. Bat. **2**: 184. 1856; Holttum in Fl. Malaya **1**: 357. 1953. — *Trichotosia microphylla* Bl., Bijdr **7**: 343. 1825; Kraenzl. in Engler, Pflanzenr. **45** (IV. 50. II. B. 21): 142. 1911; Seidenf. in Opera Bot. **62**: 14. fig. 4. 1982. — *Eria dalatensis* auct. non Gagnep.: 中国高等植物图鉴 **5**: 709. 1976; 海南植物志 **4**: 226. 1977; Z. H. Tsi et S. C. Chen in Acta Phytotax. Sin. **33** (3): 292. 1995.

植株较矮小，高4—6厘米，全体被灰白色长硬毛，仅茎近顶端处被深褐色硬毛，具根状茎；茎不膨大成假鳞茎，近簇生或相距1—1.5厘米，圆柱形，粗约2毫米，为叶鞘所包。叶5—10枚，互生，肉质，狭椭圆形或倒披针形，长0.8—1.7厘米，宽3—5毫米，先端钝，基部收狭。花序从茎上部的叶鞘中抽出，与叶相对，顶端具1花，下部具1—2枚花苞片；花苞片紧密排列，披针形，长约6毫米，先端渐尖，被长毛；花梗和子房长约3毫米，被长毛；花黄色；中萼片卵形，长约3毫米，宽1.5—2毫米，先端钝，背面疏被长毛；侧萼片长圆形，长约5毫米，基部宽约3毫米，先端钝，背面被长毛，基部与蕊柱足合生成长约4毫米的萼囊；花瓣长圆形，较中萼片略短而窄，先端圆钝，无毛；唇瓣近倒卵状长圆形，不裂，长约5毫米，宽约2.5毫米，先端钝或近于平截，近中部处稍缢缩，基部与萼囊连接处呈膝状弯曲，背面被长硬毛，表面自基部发出5条褶片，在中部缢缩处具1个长约1毫米的、椭圆形的紫色胼胝体，上部中间有1个“V”型无毛区；蕊柱极粗短，长仅约1.5毫米；蕊柱足长约4毫米；药帽半圆球形，先端钝；花粉团倒卵形或卵形，扁平，长约0.5毫米，橙黄色。蒴果椭圆状圆柱形，长约6毫米，粗约2.5毫米，密被白色长硬毛；果柄极短，长约2毫米。花期4—6月，果期11月。

产海南和云南南部(勐海)。生于海拔1000—1500米的林中树干上。越南、泰国、马来西亚和印度尼西亚也有分布。模式标本采自印度尼西亚的爪哇岛。

本种与 *Eria dalatensis* (Gagnep.) Seidenf. 十分接近，唯本种花黄色，后者花深紫色而不同。我们观察到的标本，花(干后)都为紫色或紫褐色，但其原始记载均为花纯黄色或淡黄色；此外，G. Seidenfaden (1982) 认为本种植物体被白色毛，后者被灰色毛，在我们的标本中，植物均被白色毛，但部分毛先端部分变成棕色，这种先端为棕色的毛所占比例不尽相同，但最多不超过一半。因此，我们认为两者可能应予归并，至少海南和云南的标本应归入本种中。

3. 瓜子毛兰 (中国高等植物图鉴)

Eria dasyphylla Par. et Rehb. f. in Trans. Linn. Soc. **30**: 147. 1847; Hook.