

米；花药顶生，黄色，椭圆形，长近2毫米；花粉团近倒三角形，稍扁，长约0.7毫米，深褐色（干后）。蒴果长圆柱形，长2.7厘米，粗0.4厘米。花期8月，果期9月。

产云南南部（勐腊、勐海、景洪）和西藏东南部（墨脱）。生疏林中树干上，海拔600—1500米。锡金、印度东北部、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨和越南也有分布。模式标本采自印度东北部。

35. 滇南毛兰（云南植物研究）

Eria yunnanensis S. C. Chen et Z. H. Tsi in Acta. Bot. Yunnan. **6** (4): 381. 1984.

假鳞茎椭圆形，长2.5—3厘米，粗1—1.5厘米（干后），具1—2节，基部有鞘，中部或上部着生1枚较小的叶，顶端有3—4枚大得多的叶；较小的叶狭卵形，长1.5—6.5厘米；较大的叶狭长圆状披针形或披针形，长（4—）8—16.5厘米，宽6—14毫米，先端渐尖，具9—11条主脉，基部渐狭成长1—2厘米的叶柄。花序1—2个，从靠近假鳞茎的顶端发出，近直立，长4.5—7.5厘米，具多数稍密集的花；花序轴被锈色小疏柔毛；花苞片反折，披针形，长4—5毫米，干后棕色，膜质；花梗长1—1.5毫米（不连子房）；花小，直径约3毫米，淡绿黄色；中萼片宽卵形或卵状椭圆形，长约3毫米，宽约2毫米，先端渐尖或钝，无毛；侧萼片斜卵形，与中萼片近等长，宽2毫米，基部与蕊柱足合生成萼囊；花瓣卵形或宽卵形，长约2毫米，宽1.5—1.8毫米，先端急尖，近全缘；唇瓣轮廓多少呈十字架形，约为中萼片长度的3/4，基部有爪，3裂；爪长0.6—0.8毫米，上面有槽；侧裂片为近方形的扇状，长宽各约1毫米，边缘波状；中裂片长圆形，长约1.2毫米，宽1毫米；唇盘上具4—5条稍粗厚的脉；蕊柱短，长约0.7毫米，粗厚；蕊柱足长约1.1毫米；花粉团梨形，稍扁平，长约0.4毫米，淡黄色。花期7—8月。

产云南南部（景洪）。生于海拔1500米的密灌丛中的树干上。

36. 台湾毛兰（新拟） 树绒兰（台湾植物志） 赤色毛花兰（台湾林业季刊）

Eria formosana Rolfe in Kew Bull. 194. 1896; Rolfe in J. Linn. Soc. Bot. **36**: 16. 1903; Kraenzl. in Engler, Pflanzenr. **50** (IV. 50. II. B. 21): 47. 1911; Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. **4**: 217. 1919; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **2** (3, 4): 387. 1973; ——— *E. tomentosiflora* Hayata, Icon. Pl. Formos. **2**: 137. 1912; 台湾兰科植物 **2**: 165—166 (图). 1988; 台湾兰科植物彩色图鉴 **2**: 504. 1990. ——— *E. plicatilabella* Hayata, Icon. Pl. Formos. **4**: 55. 1914. ——— *E. copelandii* auct. non Leavitt; Makino et Nemato, Fl. Jap. 1641. 1939. ——— *E. philippinensis* auct. non Ames; 台湾植物志 **5**: 984. 图. 1591. 1978.

根状茎粗，攀援状；假鳞茎常具蝎尾状分枝，每一分枝长10—15厘米，包藏于