

屏边、河口)。生于密林中树上，海拔 900—2 400 米。尼泊尔、锡金、不丹、印度、缅甸、泰国、越南也有分布。模式标本采自锡金。

G. Seidenfaden (1986) 在泰国兰科研究 (Opera Bot. 89: fig. 79.) 中曾将本种的蕊柱绘成有很长的蕊柱足，但根据我们的泡花标本观察，未见有明显的蕊柱足。

2. 台湾禾叶兰

Agrostophyllum inocephalum (Schauer) Ames, Orch. 2: 148. 1908; 台湾植物志 5: 870. 1978; 台湾兰科植物 3: 30—32 (图). 1987. — *Diploconchium inocephalum* Schauer in Nov. Acta Acad. Caes. Leop.-Carol. 19: Suppl. 1: 428. pl. 12 (fig. A). 1843. — *Agrostophyllum formosanum* Rolfe in Ann. Bot. 9: 157. 1859; 台湾兰科植物彩色图鉴 1: 418. 1977.

植株高 20—40 厘米。茎丛生，为重叠的叶鞘所包，多节，节间长约 4 厘米。叶多枚，线形，长 15—25 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，先端钝并常有不等 2 浅裂，基部具鞘；鞘较坚挺，一侧开裂，长 4—5 厘米。花序顶生，头状，直径 1.5—2.5 厘米，具多花；花苞片多枚；花梗和子房长约 7 毫米；花小，白色，后转黄色；中萼片卵状长圆形，长 4—5 毫米，宽 2—2.5 毫米，先端浑圆；侧萼片与中萼片等长，略宽；花瓣线形，长约 3.5 毫米，宽约 1 毫米；唇瓣长约 4 毫米，中部略缢缩，基部凹陷成囊状，前部亦略凹陷；蕊柱长 3—4 毫米，无蕊柱足。花期 2—3 月。

产台湾南部(屏东、台东)。生于林中树上。菲律宾也有分布。模式标本采自菲律宾。台湾标本未看到。上面描述摘自《台湾植物志》(1978)和《台湾兰科植物》(1987)。

(三十八) 柄唇兰亚族 Subtrib. Podochilinae Benth. et Hook. f.

Benth. et Hook. f., Gen. Pl. 3: 463. 1883, "Podochileae"; Schltr.
in Mém. Herb. Boiss. 21: 1. 1900.

附生或地生草本，通常具细芦苇秆状的茎或有时具假鳞茎。叶二列互生，扁平或偶见两侧压扁，具或不具关节。花序顶生或侧生，具少数至多数花；花小，扭转或下垂；萼片与花瓣离生或多少靠合；侧萼片通常生于蕊柱足上；唇瓣不裂或 3 裂，基部凹陷成囊状或距状；蕊柱短，通常有明显的蕊柱足；花药顶生而向前俯倾，或生于背侧而直立，具 4 个、6 个或 8 个花粉团和 1—2 个花粉团柄，附着于 1 或 2 小粘盘上。

本亚族模式：Podochilus Bl.

共含 6 属，分布于亚洲热带地区和大洋洲。我国有 2 属。