

近圆锥形，被细乳突状毛，前端稍收狭而近截形并具啮蚀状。花期3—4月。

产云南南部（思茅、勐腊）。生于海拔1050—1600米的山地疏林中树干上。分布于印度东北部、缅甸、泰国、越南、老挝。模式标本采自缅甸。

29. 棒节石斛（植物分类学报） 图版14: 2

Dendrobium findlayanum Par. et Rchb. f. in Trans. Lindl. Soc. **30**: 149. 1874, et Gard. Chron. n.s., **1**: 334. 1877; Hook. f. in Bot. Mag. **105**: t. 6438. 1879, et Fl. Brit. Ind. **5**: 742. 1890; Kraenzl. in Engler, Pflanzenr. **45** (IV. 50, II. B. 21): 30. 1910; Seidenf. in Opera Bot. **83**: 62, fig. 33. 1983, et l. c. **114**: 230. 1992; Z. H. Tsi et S. C. Chen in Acta Phytotax. Sin. **33** (3): 291. 1995; Z. H. Tsi, S. C. Chen et K. Mori, Wild Orch. China: 74. pl. 86. 1997; 中国兰花全书: 164. 图6—13 (9). 1998.


茎直立或斜立，通常长约20厘米，粗7—10毫米，不分枝，具数节；节间扁棒状或棒状，长3—3.5厘米，基部常宿存纸质叶鞘。叶革质，互生于茎的上部，披针形，长5.5—8厘米，宽1.3—2厘米，先端稍钝并且不等侧2裂，基部具抱茎的鞘；总状花序通常从落了叶的老茎上部发出，具2朵花；花序柄长6—16厘米，基部被长约5毫米的膜质鞘；花苞片膜质，卵状三角形，长约6毫米；花梗和子房淡玫瑰色，长5—6厘米；花白色带玫瑰色先端，开展；中萼片长圆状披针形，长3.5—3.7厘米，宽9毫米，先端近钝尖，具5条脉；侧萼片卵状披针形，长3.5—3.7厘米，宽9毫米，先端近急尖，具5条脉；萼囊近圆筒形，长5毫米；花瓣宽长圆形，长3.5—3.7厘米，宽1.8厘米，先端急尖，基部稍收狭为短爪，具5条脉；唇瓣近圆形，凹的，宽约2.4厘米，先端锐尖带玫瑰色，基部两侧具紫红色条纹；唇盘中央金黄色，密布短柔毛；蕊柱前面具紫红色条纹，长约8毫米；药帽白色，顶端圆钝。花期3月。

产云南南部（勐腊）。生于海拔800—900米的山地疏林中树干上。缅甸、泰国、老挝也有。模式标本采自缅甸。

30. 紫瓣石斛（植物分类学报）

Dendrobium parishii Rchb. f. in Bot. Zeit. **21**: 236. 1863; Batemann in Bot. Mag. **91**: t. 5488. 1865; Hook. f., Fl. Brit. Ind. **5**: 740. 1890; Kraenzl. in Engler, Pflanzenr. **45** (IV. 50, II. B. 21): 39. 1910; Z. H. Tsi in Acta Phytotax. Sin. **18** (4): 444. 1980; S. J. Cheng et C. Z. Tang in Acta Bot. Yunnan. **6** (3): 282. 1984; Seidenf. in Opera Bot. **83**: 62, fig. 34. 1985; Averyanov, Vasc. Pl. Syn. Vietnam. Fl. **1**: 78. 1990; Seidenf., l. c. **114**: 231. 1992; Averyanov, Iden. Guide Vietnam. Orch.: 196. 1994; 中国兰花全书: 169, 图6—13 (8). 1998.

茎斜立或下垂，粗壮，圆柱形，通常长10—30厘米或更长，粗1—1.3厘米，上部多少弯曲，不分枝，具数节，节间长达4厘米。叶革质，狭长圆形，长7.5—12.5厘



图版 14 1. 玫瑰石斛 *Dendrobium crepidatum* Lindl. ex Paxt.; 植株。2. 棒节石斛 *D. findlayanum* Par. et Rehb. f.; 植株的一部分。3. 肿节石斛 *D. pendulum* Roxb.; 植株的一部分。(李爱莉绘)