

宁、建水、金平、勐腊、勐海、泸水等地)。生于海拔 400—1500 米的疏林中树干上或山谷岩石上。分布于印度(德干高原、西北部和东北部)、尼泊尔、不丹、锡金、缅甸、老挝、越南、马来西亚。模式标本采自印度(德干高原)。

本种分布很广,可能是多型性的种,花色和花的大小常有变化。

34. 报春石斛(云南植物研究)

Dendrobium primulinum Lindl. in Gard. Chron.: 400. 1858; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 5: 735. 1890; Duthie in Ann. Bot. Gard. Calcutta 9: 97, pl. 98. 1906; Kraenzl. in Engler, Pflanzenr. 45 (IV. 50, II. B. 21): 39. 1910; H. Hara et al., Enum. Flow. Pl. Nepal 1: 40. 1978; S. J. Cheng et C. Z. Tang in Acta Bot. Yunnan. 3: 283. 1984; Seidenf. in Opera Bot. 83: 69, fig. 39. 1985; Averyanov, Vasc. Pl. Syn. Vietnam. Fl. 1: 80. 1990; Seidenf., l. c. 114: 232. 1992; Averyanov, Iden. Guide Vietnam. Orch.: 191. 1994; Z. H. Tsi et S. C. Chen in Acta Phytotax. Sin. 33 (3): 292. 1995; Z. H. Tsi, S. C. Chen et K. Mori, Wild Orch. China: 83, pl. 105. 1997; 中国兰花全书: 170. 图 6—13 (5). 1998. —*D. nobile* Lindl. var. *pallidiflorum* Hook. in Bot. Mag. 83: t. 5003. 1857; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. 26 (1): 159. 1973.

茎下垂,厚肉质,圆柱形,通常长 20—35 厘米,粗 8—13 毫米,不分枝,具多数节,节间长 2—2.5 厘米。叶纸质,二列,互生于整个茎上,披针形或卵状披针形,长 8—10.5 厘米,宽 2—3 厘米,先端钝并且不等侧 2 裂,基部具纸质或膜质的叶鞘。总状花序具 1—3 朵花,通常从落了叶的老茎上部节上发出;花序柄着生的茎节处呈舟状凹下,长 2 毫米,基部被 3—4 枚长 2—3 毫米的膜质鞘;花苞片浅白色,膜质,卵形,长 5—9 毫米,先端钝;花梗和子房黄绿色,长 2—2.5 厘米;花开展,下垂,萼片和花瓣淡玫瑰色;中萼片狭披针形,长 3 厘米,宽 6—8 毫米,先端近锐尖,具 3—5 条脉;侧萼片与中萼片同形而等大,先端近锐尖,基部歪斜,具 3—5 条脉;萼囊狭圆锥形,长约 5 毫米,末端钝;花瓣狭长圆形,长 3 厘米,宽 7—9 厘米,先端钝,具 3—5 条脉,全缘;唇瓣淡黄色带淡玫瑰色先端,宽倒卵形,长小于宽,宽约 3.5 厘米,中下部两侧围抱蕊柱,两面密布短柔毛,边缘具不整齐的细齿,唇盘具紫红色的脉纹;蕊柱白色,长约 3 毫米;药帽紫色,椭圆状圆锥形,顶端多少凹的,密布乳突状毛,前端边缘宽凹缺。花期 3—4 月。

产云南东南部至西南部(文山、思茅、勐腊、勐海、龙陵、镇康)。生于海拔 700—1800 米的山地疏林中树干上。分布于从印度西北部经尼泊尔、锡金、印度东北部、缅甸、泰国、老挝、越南。模式标本采自印度东北部。

本种酷似上种,区别在于本种的茎较粗短,花序柄从茎节的凹下处发出,花瓣几乎与萼片等宽,易于区别。