

10. 滇南石豆兰 (植物分类学报) 图版 26: 9

Bulbophyllum psittacoglossum Rchb. f. in Bot. Zeit. **21**: 236. 1863; Hook. f., Fl. Brit. Ind. **5**: 754. 1890; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. **33** (3): 30, fig. 13. 1979, et in Opera Bot. **114**: 317. 1992; Z. H. Tsi et S. C. Chen in Acta Phytotax. Sin. **33** (3): 289. 1995. — *Sarcopodium psittacoglossum* (Rchb. f.) Hook. in Bot. Mag. **89**: t. 5408. 1863.


假鳞茎卵形，卧伏在根状茎上，彼此无明显的间隙，仅上部稍抬起，长 15—30 毫米，粗 10—15 毫米，被膜质鞘，顶生 1 枚叶。叶片椭圆形或长圆形，长 3—15 厘米，宽 1.7—3.7 厘米，先端钝并且稍凹入，基部具长 5—10 毫米的柄。花葶从假鳞茎基部发出，具 1—2 朵花；花序柄长 7—25 毫米，基部被鞘；花苞片宽卵形，长 7—10 毫米，先端锐尖；花梗和子房纤细，圆柱形，长 2—3 厘米；花黄色带紫色斑点；中萼片椭圆形，长 12 毫米，中部宽 6 毫米，先端锐尖，具 7 条脉；侧萼片卵状三角形，长 17 毫米，基部上方宽 8 毫米，先端锐尖，具 7 条脉；花瓣倒卵状椭圆形，长 9 毫米，中部宽 5 毫米，先端钝，具 4 条脉；唇瓣舌形，肉质，基部两侧边缘稍具齿，中部以上稍向外下弯，基部与蕊柱足连接而形成活动关节，先端钝，上面密被疣状突起，中央具 2 条波状褶片；蕊柱粗短，长约 3 毫米；蕊柱足长 7 毫米，其分离部分长 3 毫米；蕊柱翅在蕊柱基部上方向前扩展为前端近锐尖的三角形；蕊柱齿牙齿状；药帽长圆锥形，前端收窄为狭长的尖头。 花期 6 月。

产云南南部至东南部 (勐腊、石屏、文山、景东、河口)。生于海拔达 1500 米的山地疏林中树干上或向阳山坡的岩石上。分布于越南、泰国、缅甸。模式标本产于缅甸。

11. 短齿石豆兰 (新拟) 图版 25: 4

Bulbophyllum griffithii (Lindl.) Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. **6**: 247. 1861; Hook. f., Fl. Brit. Ind. **5**: 756. 1890. — *Sarcopodium griffithii* Lindl., Fol. Orch.: 6. 1853. — *Bulbophyllum calodictyon* Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. **4**: 70. 1919; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **25**(1,2):61. 1972.

根状茎匍匐生根，粗约 2 毫米。假鳞茎紧靠，下部多少伏贴在根状茎上，中部以上斜立，卵状圆柱形，长 1.5—2 厘米，中部粗 5—7 毫米，顶生 1 枚叶，基部被膜质鞘或鞘腐烂后残留的纤维，干后棕黄色，具许多纵皱纹。叶革质，长圆形，长 3.7—7 厘米，中部宽 1—1.8 厘米，先端钝并且稍凹入，基部楔形。花葶从根状茎基部发出，1—2 个，直立，细圆柱形，连同花梗和子房长约 4 厘米；花序柄长约 1 厘米，顶生 1 朵花，基部被 2—3 枚鞘；鞘膜质、筒状，长 5—17 毫米；花苞片干膜质，杯状或佛焰苞状，长约 6 毫米，先端锐尖；花淡黄色带褐色斑点；中萼片卵形，凹的，长约 1 厘米，中部宽 5 毫米，先端锐尖，具 7 条脉；侧萼片卵状三角形，与中萼片等长，中部宽约 7 毫米，先端近急尖，基部贴生在蕊柱足上而形成宽钝的萼囊；花瓣近长圆形，长 7 毫米，



图版 26 1—2. 豹斑石豆兰 *Bulbophyllum colomaculosum* Z. H. Tsi et S. C. Chen; 1. 植株, 2. 花。3—7.
勐海石豆兰 *B. menghaiense* Z. H. Tsi; 3. 植株, 4. 带有花梗连同子房和蕊柱的唇瓣, 5. 中萼片, 6. 花瓣,
7. 侧萼片。8. 长足石豆兰 *B. pectinatum* Finet; 花。9. 滇南石豆兰 *B. psittacoglossum* Rchb. f.; 花。

(蔡淑琴绘)