

24. 乐东石豆兰 (植物分类学报) 图版 28: 1—2

Bulbophyllum ledungense T. Tang et F. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **12** (1): 45. 1974; 海南植物志 **4**: 239. 1977.

根状茎匍匐，粗 1—2 毫米，分枝。根出自生有假鳞茎和不生假鳞茎的节上。假鳞茎在根状茎上彼此相距 1—4 厘米，圆柱状或椭圆形，直立或稍弧曲上举，长 8—13 毫米，中部粗 3—5 毫米，顶生 1 枚叶，幼时在基部具 3 枚大小不等的膜质鞘。叶革质，长圆形，长 1.5—3 厘米，中部宽 3—8 毫米，先端圆钝而稍凹入，基部收窄为长约 1—2 毫米的柄。花葶 1—2 个，从假鳞茎基部或两假鳞茎之间的根状茎上发出，直立，纤细，长 10—20 毫米；总状花序缩短呈伞状，具 2—5 朵花；花序柄具 3 枚膜质鞘；鞘宽松地围抱花序柄，长约 3 毫米，先端渐尖；花苞片小，长圆形，与花梗连同子房等长，长约 2.5 毫米，先端渐尖；萼片离生，质地较厚，披针形，长 4—6 毫米，基部上方宽约 1.2 毫米，先端渐尖，中部以上两侧边缘稍内卷，具 3 条脉；侧萼片比中萼片稍较长，基部贴生在蕊柱足上；花瓣长圆形，长 2 毫米，中部宽 0.8 毫米，先端短急尖，基部稍收窄，全缘，具 3 条脉，仅中肋到达先端；唇瓣肉质，狭长圆形，长约 1.2 毫米，中部宽 0.4 毫米，先端圆钝，基部具凹槽，上面两侧各具一条紧靠边缘而纵走的龙骨脊，下面多少具细乳突；蕊柱粗短，长约 0.8 毫米；蕊柱齿钻状，与药帽等高，长约 0.4 毫米；蕊柱足长 0.8 毫米，其分离部分长约 0.3 毫米；药帽前缘先端具短尖。花期 6—10 月。

产海南（乐东、保亭）。生于山坡林下岩石上。

本种很近短足石豆兰 *Bulbophyllum stenobulbon* Par. et Rchb. f.，但唇瓣狭长圆形而不同。

25. 密花石豆兰 (中国高等植物图鉴) 图版 28: 8—9

Bulbophyllum odoratissimum (J. E. Smith) Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl.: 55. 1830; Hook. f., Fl. Brit. Ind. **5**: 758. 1890; King et Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calcutta **8**: 79, pl. 109. 1898; Rolfe in J. Linn. Soc. Bot. **36**: 13. 1903; Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. **4**: 249. 1919; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **25** (1, 2): 62. 1972; 中国高等植物图鉴 **5**: 734. 图 8298. 1976; S. Y. Hu, Gen. Orch. Hong Kong: 86. 1977; H. Hara et al., Enum. Flow. Pl. Nepal **1**: 33. 1978; Seidenf. in Dank Bot. Ark. **33** (3): 76, fig. 43. 1979, et in Opera Bot. **114**: 297. 1992; Averyanov, Iden. Guide Vietnam. Orch.: 266. 1994; 福建植物志 **6**: 624. 图 546. 1995; Z. H. Tsi et S. C. Chen in Acta Phytotax. Sin. **33** (3): 289. 1995; Z. H. Tsi, S. C. Chen et K. Mori, Wild Orch. China: 93, pl. 139. 1997. — *Stelis odoratissima* J. E. Smith in Ress Cyclop. **34**: 12. 1814. — *Bulbophyllum congestrum* Rolfe in Kew Bull.: 131. 1912; Schltr. in Fedde Repert. Sp.



图版 28 1—2. 乐东石豆兰 *Bulbophyllum ledungense* T. Tang et F. T. Wang; 1. 植株, 2. 中萼片、花瓣、侧萼片和带有子房、蕊柱的唇瓣。3—4. 载唇石豆兰 *B. hastatum* T. Tang et F. T. Wang; 3. 植株, 4. 中萼片、花瓣、侧萼片和带有子房、蕊柱的唇瓣。5—6. 聚株石豆兰 *B. sutepense* (Rolfe ex Downie) Seidenf. et Smitin.; 5. 植株, 6. 中萼片、花瓣、侧萼片和带有子房、蕊柱的唇瓣。7. 广东石豆兰 *B. kwangtungense* Schltr.; 中萼片、花瓣、侧萼片和带有子房、部分蕊柱的唇瓣。8—9. 密花石豆兰 *B. odoratissimum* (J. E. Smith) Lindl.; 8. 中萼片、花瓣、侧萼片和带有子房、部分蕊柱的唇瓣; 9. 中萼片、花瓣、侧萼片和带有子房、部分蕊柱的唇瓣。(冀朝桢绘)