

隆起。花葶从假鳞茎基部抽出，直立，圆柱形，长 13—14 厘米，伞形花序具数朵花；花序柄粗约 1.5 毫米，被 2—3 枚筒状鞘；鞘紧抱于花序柄，长约 5 毫米，先端近锐尖；花苞片卵状披针形，长约 4 毫米，先端急尖；花梗连同子房长约 8 毫米，子房多少被乳突状毛；萼片和花瓣黄褐色密布紫色斑点；中萼片卵形，凹的，长 7.5 毫米，中部宽 5 毫米，先端锐尖，边缘多少不整齐，尤其近先端处具齿，具 3 条脉；侧萼片狭披针形，长 2 厘米，基部上方宽 4 毫米，先端渐尖，具 3 条脉，基部贴生在蕊柱足上并且呈 180 度扭转而两侧萼片的上侧边缘彼此粘合，下侧边缘内卷；花瓣狭卵形，长 4.2 毫米，宽 2.2 毫米，先端近锐尖，边缘具齿，具 1—3 条脉；唇瓣黄褐色，肉质，从中部向外下弯，披针形，光滑无毛，长 5 毫米，中部宽 1 毫米，先端近锐尖，上面具 2 条脊突，脊突之间有一凹槽，基部与蕊柱足末端连接而形成关节；蕊柱长约 1.5 毫米，具长约 2 毫米的蕊柱足，其分离部分长 1 毫米；蕊柱翅在蕊柱中部向前扩展呈三角形；蕊柱齿短钻状；药帽光滑无毛，前端边缘稍 3 裂。花期 6 月。

产云南南部（勐腊）。生于海拔约 800 米的密林中树干上。分布于缅甸、泰国、老挝、越南、马来西亚、印度尼西亚。模式标本采自缅甸。

本种近尖角卷瓣兰 *Bulbophyllum forrestii* Seidenf.，但中萼片边缘不整齐，先端锐尖，药帽前端多少 3 裂。

60. 二色卷瓣兰（新拟）

Bulbophyllum bicolor Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl.: 49. 1830; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. 29 (1): 111, fig. 56. 1973. — *Cirrhopetalum bicolor* (Lindl.) Rolfe in J. Linn. Soc. Bot. 36: 14. 1903; Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. 4: 251. 1919; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. 25 (3, 4): 217. 1972, et Gen. Orch. Hong Kong: 86. 1977.

根状茎粗壮，粗 3—4 毫米，每相隔 3—4 厘米生 1 个假鳞茎。假鳞茎卵球形，长 1.5—2 厘米，粗 8—13 毫米，顶生 1 枚叶，干后淡黄色，具光泽。叶革质，长圆形，长 10.4—14 厘米，宽 1.8—2.3 厘米，先端钝并且稍凹入，基部收狭为长约 1.5 厘米的柄。花葶从假鳞茎基部发出，长约 5 厘米，伞形花序具 1—3 朵花；花序柄被 1—2 枚鞘；花苞片披针形，长 6 毫米；花梗和子房长 1.5 厘米；花淡黄色，在基部内面具紫色斑点；萼片和花瓣先端紫红色；中萼片长圆形，长 15 毫米，宽约 10 毫米，先端渐尖，边缘具肥厚的红色缘毛；侧萼片斜卵状披针形，长约 20 毫米，宽约 7.5 毫米，先端钝，基部上方扭转而下侧边缘在基部彼此粘合；花瓣长圆形，长约 10 毫米，宽约 6 毫米，先端具短尖、紫红色，边缘全缘；唇瓣橄榄绿色，后变为橘红色，卵形，向外下弯，与蕊柱足末端连接而形成 1 个活动关节，先端钝；蕊柱短，上端两侧各具 1 枚狭齿状的蕊柱齿；蕊柱翅在蕊柱中部向前伸展呈三角形。花期 5 月。

产香港。生境、海拔不详。