

根状茎匍匐，细长。假鳞茎在根状茎上彼此相距 4—10 毫米，卵球形，长约 5 毫米，粗 2—4 毫米，具纵条棱，顶生 1 枚叶。叶片革质，卵状长圆形，长 8—12 毫米，宽 5—8 毫米，先端稍钝或凹入，基部收狭为短柄。花葶从假鳞茎基部发出，斜立，长约 4 毫米，与假鳞茎近等长；伞形花序具 2 朵花；花小，萼片黄色；中萼片卵形，凹的，长 3.5 毫米，宽 2.5 毫米，先端稍钝，具 3 条脉，背面基部和边缘具长柔毛；侧萼片狭长圆形，长约 1 厘米，宽 1.5 毫米，具 1 条脉，边缘全缘，先端稍钝，基部贴生在蕊柱足上，基部上方扭转而两侧萼片的下侧边缘除先端外彼此粘合；花瓣紫红色，倒卵状长圆形，长约 2 毫米，中上部宽 1 毫米，先端圆钝，具 3 条脉，边缘具长柔毛；唇瓣紫红色，肉质，三角状披针形，长 3.5 毫米，近基部宽 1.5 毫米，中下部两侧对折，向先端渐尖，基部与蕊柱足末端连接而形成关节；蕊柱粗短，长 1.2 毫米；蕊柱翅在蕊柱中部扩大呈三角形，蕊柱足长约 2 毫米；蕊柱齿狭而尖，药帽近半球形。 花期 5—6 月。

产河南（西峡）。生于海拔 800—1100 米的山地林中树干上。

66. 白毛卷瓣兰（台湾植物志） 白缘石豆兰（台湾兰科植物彩色图鉴）

Bulbophyllum albociliatum (T. S. Liu et H. J. Su) Seidenf. in Dansk Bot. Ark. **29** (1) : 89, fig. 42. 1973; Nackejima in Bot. Mag. Okinawa **10**: 36. 1973; 台湾兰科植物彩色图鉴 **1**: 423. 1977; 台湾植物志 **5**: 892. 1978; 台湾兰科植物彩色图鉴 **1**: 106, 107. 彩色图版 17. 1996. — *Cirrhopetalum albociliatum* T. S. Liu et H. J. Su in Quart. J. Taiwan Mus. **24**: 173. 1971.

根状茎匍匐，细长，粗约 1 毫米。假鳞茎在根状茎上彼此相距约 2 厘米，长卵形，多少斜立，长 1—1.3 厘米，粗 5—7 毫米，顶生 1 枚叶。叶倒披针形或倒卵形，长 2.5—4 厘米，宽 8—10 毫米，先端圆钝，有时具凹头，基部收狭，无柄。花葶从假鳞茎基部抽出，长 5—6 厘米，伞形花序具 5—6 朵花；花序柄纤细，具 2 枚鳞片状鞘；花苞片狭三角形，长 3 毫米；花梗和子房长 5 毫米；中萼片红色，凹的，椭圆形，长 3 毫米，宽 2 毫米，先端圆形，基部近截形，边缘具白色长毛；侧萼片淡红黄色，披针形，长 7 毫米，宽 2 毫米，先端急尖基部上方扭转而两侧萼片的上侧边缘彼此粘合；花瓣红色，椭圆形，长 2 毫米，宽 1.2 毫米，先端圆形，基部收狭，边缘具白色长毛；唇瓣红色，角状，长 1.5 毫米，向外下弯；蕊柱黄色，半圆柱形，长 1.5 毫米，两侧具明显的翅；蕊柱齿细长，药帽半球形。 花期 4—5 月。

产台湾（宜兰、南投、台东）。生于海拔 1300—1800 米的山地林中树干上。

本种我们没有看到标本，以上描述是来自于《台湾植物志》(1978)。

67. 瓶壶卷瓣兰（新拟） 图版 35: 1—4

Bulbophyllum insulsum (Gagnep.) Seidenf. in Dansk Bot. Ark. **29** (1) : 141, fig. 68. 1973, et in Opera Bot. **114**: 267., fig. 175. 1992; Averyanov, Iden. Guide