

茎基部抽出，高出叶外，伞形花序具数朵花；花序柄纤细，粗约 0.6 毫米，疏生 2—3 枚鞘；花苞片狭披针形，长约 3 毫米；花梗和子房长约 6 毫米；花淡黄色密布紫红色条纹；中萼片卵形，长约 5 毫米，中部宽 2.5 毫米，先端急尖，边缘具流苏，具 3 条脉；侧萼片狭披针形，长 1.2—2 厘米，先端近急尖，基部较宽并且贴生在蕊柱足上，全缘，具 5 条脉，基部上方扭转而两侧萼片的上下侧边缘分别彼此粘合；花瓣卵状三角形，长约 3.5 毫米，基部上方宽约 1.8 毫米，先端近钝尖，并且具一块黑色斑块，边缘具缘毛，具 1 条脉；唇瓣上面稍红色，背面黄色，肉质，舌状，长约 2.5 毫米，从中部向外下弯，基部与蕊柱足末端连接而形成关节；蕊柱黄色，近直立，长约 1.5 毫米；蕊柱足长约 1.5 毫米，具许多紫红色斑点；蕊柱齿钻状，长 1 毫米；药帽黄色，前端近截形，具细乳突。花期 5—7 月。

产台湾（台东、高雄、南投、花莲等地）、福建（闽侯、和溪、南靖）、海南（陵水）。生于海拔 700—1800 米的山地林中树干上或沟谷岩石上。模式标本采自台湾。

72b. 红斑石豆兰（变种）

var. *rubropunctatum* S. S. Ying, Col. Ill. Indig. Orch. Taiwan 2: 415. 1990; 台湾兰科植物彩色图志 1: 134. 彩色图版 28. 1996.

本变种不同于原变种在于萼片密布不规则的暗红色斑点和短的条纹。

产于台湾（台中、花莲）。常生海拔 900—1500 米的山地林中树干上和沟谷岩石上。

73. 邵氏卷瓣兰（新拟） 邵氏石豆兰（台湾兰科植物彩色图志）

Bulbophyllum linchianum S. S. Ying, Col. Ill. Indig. Orch. Taiwan 1: 61, 424, fig. 11. 1977; 台湾兰科植物彩色图志 1: 124, 129. 彩色图版 23. 1996.

根状茎匍匐，粗约 1—1.5 毫米。假鳞茎卵球形，长 1—1.5 厘米，粗 5—7 毫米，向上变狭，顶生 1 枚叶。叶革质，长椭圆形或椭圆状披针形，长 4—8 厘米，宽 1—1.5 厘米，先端钝并且凹入，基部收狭为长 3—4 毫米的柄。花葶从假鳞茎基部侧旁发出，长 8—10 厘米，花序柄基部具长 3—5 毫米的膜质鞘；花苞片小，淡黄色，长 2—3.5 毫米，先端锐尖；花梗和子房长 9—12 毫米，红色；花红色，不带任何斑点和斑块；中萼片卵形，长 4—5 毫米，宽约 2.5 毫米，先端渐尖，边缘具缘毛；侧萼片狭披针形，长 1.5—1.8 厘米，宽 2—3 毫米，先端渐尖，基部扭转而上下侧边缘在中部以上彼此粘合，全缘；花瓣长椭圆形或卵状长圆形，长 2.5—3.5 毫米，宽 2—2.5 毫米，先端钝，边缘具缘毛；唇瓣厚，舌状，长 4—5 毫米，向外下弯，基部中央具 1 个凹槽；蕊柱长 2—3 毫米。

产台湾（花莲）。生于海拔 400—1200 米的山地林中树干上。

该种我们没有看到标本，以上是种的原始文献记载。从原始描述来看，十分近紫纹卷瓣兰 *B. melanoglossum* Hayata，除花的颜色有差异外，很难找到它们之间的不同点。今后进一步的研究有可能归入上种，或作为上种的种下等级。