

梗和子房长 1.5—2 厘米；花黄色；中萼片卵形，长 1—1.4 厘米，中部宽 7 毫米，先端稍钝并且具 2—3 条髯毛，边缘全缘，具 5 条脉；侧萼片披针形，长约 3 厘米，中部宽 5 毫米，先端稍钝，基部贴生在蕊柱足上，边缘全缘，基部上方扭转而两侧萼片呈八字形叉开；花瓣卵状三角形，长约 5 毫米，中部宽 4 毫米，先端紫褐色、钝并且具细尖，中部以上边缘具流苏，近先端处尤甚，具 3 条脉；唇瓣肉质，舌形，长约 7 毫米，向外下弯，基部与蕊柱足末端连接而形成活动关节，后半部两侧对折，先端钝，边缘多少具睫毛，近先端处两侧面疏生细乳突；蕊柱长约 4 毫米；蕊柱翅在蕊柱中部稍向前伸展呈半月形；蕊柱足弯曲，长 5 毫米，其分离部分长 2 毫米；蕊柱齿三角形，长约 1 毫米，先端急尖呈尖牙齿状，药帽前缘具短流苏。花期 3—4 月。

产台湾（台中、南投、高雄、阿里山等地）、福建北部（崇安）、浙江中西部（兰溪）、湖北西部（兴山）、湖南北部（桑植）、广东北部（乳源）、广西（地点不详）。生于海拔 1000—1850 米的山地林中树干上或沟谷岩石上。模式标本采自台湾。

本种的中萼片先端和花瓣中部以上边缘具髯毛，药帽前端边缘具流苏状缘毛，很好识别。

76. 中华卷瓣兰（新拟）

Bulbophyllum chinense (Lindl.) Rehb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. **6**: 260. 1861; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. **29** (1): 56, fig. 17. 1973. ——*Cirrhopetalum chinense* Lindl. in Bot. Ret. **28** (Misc.): 37. 1842, et **29**: t. 49. 1843; Rolfe in J. Linn. Soc. Bot. **36**: 141. 1903; Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. **4**: 252. 1919; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **25** (3,4): 218. 1972.

叶披针形。花葶长 12 厘米，被 2 枚紧抱于花序柄的鞘；伞形花序具数朵花；花苞片披针形，长 5 毫米；花梗连同子房长 1.5 厘米；中萼片黄色带紫红色先端，长圆形，长 10 厘米，宽 5 毫米，先端具短尖，边缘具细齿；侧萼片黄色带紫红色先端，卵状披针形，长 17 毫米，宽约 5 毫米，基部上方扭转，仅下侧边缘在基部粘合；花瓣紫堇色，卵状椭圆形，长 6 毫米，宽 3 毫米，先端近钝，边缘具细缘毛，近先端内面被短毛；唇瓣肉质，舌形，向外下弯，先端钝，基部与蕊柱足连接而形成活动关节，无毛；蕊柱在基部向前隆起呈半圆形；蕊柱足向前弯曲，长约 6 毫米，其分离部分长 2 毫米；蕊柱齿长钻状，长约 3 毫米。花期 6 月。

产中国，无详细地点、生境和海拔。

本种我们没有看到完整的标本，以上描述仅根据保存在英国邱园标本馆的模式标本（一个花序）和本种的原始文献记载而作出的。

77. 黄花卷瓣兰 紫花卷瓣兰（海南植物志）

Bulbophyllum obtusangulum Z. H. Tsi in Acta Phytotax. Sin. **33** (6): 578, fig. 1 (1—4). 1995; Z. H. Tsi, S. C. Chen et K. Mori, Wild Orch. China: 93, pl.