

体轮廓为宽卵形，长 3.2 毫米，基部与蕊柱足连接而形成活动关节，中部以上骤然收狭而呈 3 裂，侧裂片近半圆形；中裂片短小，披针形，长约 1 毫米，先端钝；唇盘具一对八字形的胼胝体；蕊柱长 2 毫米；蕊柱足向上弯曲，长 2.5 毫米，其分离部分长约 1 毫米；药帽光滑无毛。花期 11 月。

产海南（吊罗山）。生于海拔约 500 米的混交林中树干上。

本种近圆叶石豆兰 *Bulbophyllum drymoglossum* Maxim. 和小叶石豆兰 *B. tokioi* Fukuyama，不同于前者在于花序具 2 朵花，花纯黄色，唇瓣宽卵形，中部以上骤然 3 裂，中裂片很短小；与后者的区别在于花序伞形，唇瓣形状也不同。

90. 台湾石豆兰 小豆兰（台湾兰科植物），细豆兰（台湾植物志），耳唇石豆兰（台湾兰科植物彩色图鉴）

*Bulbophyllum aureolabellum* T. P. Lin, Nat. Orch. Taiwan 1: 38—39 (t.). 1975; 台湾兰科植物彩色图鉴 1: 423. 1977; 台湾植物志 5: 892. 1978; 台湾兰科植物彩色图志 1: 108, 113. 彩色图版 17 (C-D). 1996. — *B. gracillimum* Hayata, Icon. Pl. Formos. 2: 132. 1912, et 4: 46, fig. 18. 1914; Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. 4: 248. 1919.

根状茎细长，粗约 7 毫米，节间长 1—2 厘米，被长约 3 毫米的筒状鞘，每节生 1—3 条根，每相隔两个节间生 1 枚叶。无假鳞茎。叶质地厚，椭圆形或长椭圆形，长 2—3 厘米，宽 8—10 毫米，先端圆钝，基部收狭为长 1—2 毫米的柄，具多数脉。花葶从根状茎的节上抽出，长约 2 厘米，中部以下具 2 枚长 1—2 毫米的筒状鞘；总状花序具 (1—) 2—3 朵花；花苞片卵形，长约 3 毫米，宽约 1.5 毫米，先端渐尖；萼片和花瓣黄白色，萼片等长；中萼片近长椭圆形，长 3—3.6 毫米，宽 1.3—1.5 毫米，先端钝，具 3 条脉；侧萼片斜卵状三角形，基部贴生在蕊柱足上而形成圆锥形的萼囊，具 3 条脉；花瓣小，线形，长约 1.5 毫米，具 1 条脉；唇瓣橙黄色，椭圆形，长 1.5 毫米，宽 0.3 毫米，基部直立，从中部向外下弯，先端圆钝，唇盘具 3 条脊；蕊柱很短，具长约 1.3 毫米的蕊柱足，蕊柱齿短角状。

产台湾（北部和中部山地）。生于海拔 400—1500 米的山地林中树干上。

本种我们未见到标本，上面描述是来自原始文献的记载。

91. 小叶石豆兰（中山自然科学大辞典）

*Bulbophyllum tokioi* Fukuyama in Bot. Mag. Tokyo 49: 439. 1935; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. 25 (1, 2): 63. 1972; Masamune in J. Geobot. 20 (4): t. 185. 1972; 台湾兰科植物彩色图 1: 426, 1977; 台湾植物志 5: 901. 1978; 台湾兰科植物 3: 51—52 (图). 1987. — *B. tokioi* Fukuyama f. *alboviride* Fukuyama in Bot. Mag. Tokyo 52: 245. 1938.

根状茎匍匐状延伸，粗约 0.5 毫米，被筒状鞘。无假鳞茎。叶在根状茎上疏生，椭