

(钦县、桂平、凌云)、云南(屏边、蒙自、金平、西畴、勐腊、勐海、贡山一带)和西藏东南部。生于海拔250—2000米的山地林中树干上。分布于尼泊尔、锡金、印度东北部、缅甸、泰国、老挝、越南。模式标本产于印度东北部。

本种的叶形和花的颜色有变化,分布于云南西北部的植物,其叶为半圆柱状,其他地区的为扁平的,在同一地区花的颜色也稍有变化,然而它们的花在形状、结构上完全一致。因此,我们同意一些作者把它们视为一种。

3. **台湾匙唇兰**(新拟) 羞花兰(台湾兰科植物),芦兰(台湾植物志),密花芦兰(台湾兰科植物彩色图鉴)

Schoenorchis venoverbeghii Ames, Orch. **5**: 242. 1915; 台湾植物志 **5**: 1101. 图1640. 1978. ——*S. paniculata* Bl. var. *vanoverbeghii* (Ames) S. S. Ying, Col. Ill. Ind. Orch. Taiwan **1**: 499. 1977, et **2**: 652. 1990. ——*S. paniculata* auct. non Bl.: T. S. Liu et H. T. Su in Quart. J. Taiwan Mus. **25** (1): 150. 1972; 台湾兰科植物 **1**: 242—243 (图). 1975.

茎长达15厘米,节间长约5毫米。叶二列互生,扁平,狭长圆形或狭倒披针形,长5—6厘米,宽7毫米,先端钝或不等侧2裂,基部楔形并且具1个关节和鞘。花序出自叶腋,长6—7厘米,具分枝,密生许多小花;花苞片很小,三角形,长3毫米;花梗和子房圆柱形,长2毫米;花白色,不甚开展;中萼片椭圆形,长2—2.3毫米,宽1—1.2毫米,先端圆形;侧萼片斜卵形,长2.3—2.5毫米,宽1.2—1.5毫米,先端稍钝;花瓣倒卵形或椭圆形,长2毫米,宽0.9—1毫米,先端圆形;唇瓣肉质,匙形,长约2.5毫米,宽约1.3毫米,3裂;侧裂片直立,近半圆形;中裂片较厚,近倒圆锥形;距近椭圆状,长1.3毫米,在距口的前壁具1个舌状附属物;蕊柱长0.6毫米。花期3—5月。

产台湾(台北、台东)。生于海拔约1000米的山地林中。也分布于菲律宾(模式标本产地)。

我们没有看到本种的标本,上面的描述摘自《台湾植物志》(1978)和《台湾兰科植物》(1975)的记载。从记载来看非常近于匙唇兰 *Schoenorchis gemmata* (Lindl.) J. J. Smith, 区别仅在于本种的花白色,花瓣先端圆形。

138. 毛舌兰属 *Trichoglottis* Bl.

Bl., Bijdr. **6**: t, 3, fig. 8, et **8**: 359. 1825; Garay in Bot. Mus.

Leaflet. Harvard Univ. **23** (4): 208. 1972; Seidenf. in Opera Bot.

95: 76—87. 1988.

附生草本。茎上举或悬垂,短或长,具少数至多数节。叶二列,稍肉质,狭窄,先