

区)。海拔达 2800 米，生于大树枝干上。模式标本采自台湾。

4. 台湾白点兰 (新拟) 台湾风兰 (南投县植物志)，台湾风铃兰 (台湾兰艺)

Thrixspermum formosanum (Hayata) Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. **4**: 237. 1919; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **28** (1, 2): 171. 1975; T. P. Lin et C. C. Hsu in Taiwaniana **22** (1): 65, fig. 8. 1977; 台湾兰科植物 **2**: 306—309 (图). 1977; 台湾兰科植物彩色图谱 **1**: 504. 1977; 台湾植物志 **5**: 1112. 1978; Seidenf. in Opera Bot. **114**: 408. 1992; Averyanov. Iden. Guide Vietnam. Orch.: 403. 1994. — *Sarochilus formosanus* Hayata in J. Coll. Sci. Univ. Tokyo **30**: 336. 1911. — *Dendrocolla pricei* Rolfe in Kew Bull.: 144. 1913. — *Thrixspermum pricei* (Rolfe) Schltr. l. c. **4**: 274. 1919. — *T. sasaoi* Masamune in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. **24**: 280. 1934.

茎近斜立，长约 1 厘米，具数至多枚二列的叶。叶稍肉质，密集于茎上，近斜立或稍向外弯，狭长圆形，通常长 3—4 厘米，宽 4—5 毫米，先端锐尖并且微 2 裂，基部具彼此套叠的鞘。总状花序侧生于茎的基部，长约 4 厘米；花序轴短，纤细，向上变粗，常具 1—2 朵花；花苞片彼此靠近，螺旋状排列，宽卵状三角形，长约 1 毫米；花梗和子房长约 9 毫米；花序轴上从下至上逐渐开放，白色，具香气，寿命约半天；中萼片椭圆形，长约 6 毫米，宽 2.8 毫米，先端钝，具 5 条脉；侧萼片斜卵状椭圆形，稍比中萼片大，先端稍钝，基部稍收狭，具 5 条脉；花瓣镰刀状长圆形，长 5.3 毫米，宽 1.8 毫米，先端钝，具 3 条脉；唇瓣长 4—5 毫米，基部具长约 4 毫米的囊，3 裂；侧裂片直立，长约 3 毫米，近卵形，先端钝，内面具棕紫色斑点；中裂片不明显，其上密布白毛；唇盘被长毛并且具 1 枚肉质鳞片状的附属物；蕊柱长约 2 毫米，具长 2 毫米的蕊柱足。花期 2—3 月。

产台湾，广泛分布于全省低海拔山区，附生于乔木或灌木枝干上。越南也有。模式标本采自台湾。

5. 三毛白点兰 (新拟) 高士佛风铃兰 (台湾兰艺)，高士佛风兰 (中山自然科学大辞典)

Thrixspermum merguense (Hook. f.) Kuntze in Rev. Gen. Pl. **2**: 682. 1891; Seidenf. in Opera Bot. **95**: 159, fig. 97. 1988; Averyanov, Vasc. Pl. Syn. Vietnam. Fl. **1**: 159. 1990; Seidenf. l. c. **114**: 406. 1992; Averyanov, Iden. Guide Vietnam. Orch.: 364. 1994. — *Sarcohilus merguense* Hook. f., Fl. Brit. Ind. **6**: 40. 1890. — *S. kusukusense* Hayata, Icon. Pl. Formos. **6**: 83. 1916. — *Thrixspermum kusukusense* (Hayata) Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. **4**: 274. 1919; 台湾兰科植物 **2**: 310—311 (图). 1977; 台湾植物志 **5**: 1112. 1978.

茎长 2—3 厘米，具数枚叶。叶肉质，狭长圆形，长 2—5 厘米，宽 5—6 毫米，先