

长约 2.5 毫米，先端钝尖；花梗和子房长约 5 毫米；花淡黄色；中萼片长圆形，长 5—7 毫米，宽 2.5—3 毫米，先端钝，具 3 条脉；侧萼片卵状披针形，与中萼片等长而稍较宽，先端钝，具 3 条脉；花瓣狭长圆形，长 5—6 毫米，宽 1.5—2 毫米，先端钝，具 1 条脉；唇瓣基部具长约 1 毫米的爪，3 裂；侧裂片近直立而向前弯曲，狭卵状长圆形，长约 2.5 毫米，宽约 1.2 毫米，上端圆形；中裂片很小，半圆形，肉质，宽约 0.5 毫米，背面多少呈圆锥状隆起；唇盘基部稍凹陷，密被绒毛。花期 9—10 月。

产台湾（台北乌来一带）、湖南（地点不明）、广东北部（乳源）、四川（南川、峨眉山、城口）、贵州东北部（梵净山）。常生于海拔 900—1000 米的沟谷、河岸的林缘树枝上。分布于日本（模式标本产地）。

11. 抱茎白点兰（植物分类学报）

Thrixspermum amplexicaule (Bl.) Rchb. f. in Xen. Orch. **2**: 121. 1867; Seidenf. in Opera Bot. **95**: 156, fig. 93. 1988; Averyanov, Vasc. Pl. Syn. Vietnam. Fl. **1**: 157. 1990; Seidenf., l. c. **114**: 403. 1992; Seidenf. et J. J. Wood, Orch. Penins. Malay. Singap.: 645. 1992; Averyanov, Iden. Guide Vietnam. Orch.: 359. 1994; Z. H. Tsi et S. C. Chen in Acta Phytotax. Sin. **33** (3): 591. 1995; 中国兰花全书: 68. 1998. — *Dendrobium amplexicaulis* Bl., Bijdr. **7**: 288. 1825.

本种附生于临海的海台石上。茎细长，稍扁三棱形，长约 35 厘米，粗约 2 毫米，具多节，节间长约 2 厘米，每节长出 1 条气根。叶疏生，质地薄，卵状披针形，长 2—2.5 厘米，基部上方宽约 7 毫米，先端稍尖而微 2 裂，基部无柄呈心形抱茎。花序纤细，花序轴较长，花苞片二列；蒴果细长，圆柱形。尚未见到花，但从植物体的形态来看无疑是本种。

产海南（琼山）。分布于菲律宾、泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚至巴布亚新几内亚。模式标本产于印度尼西亚（爪哇）。

12. 白点兰（中国高等植物图鉴） 图版 50: 3

Thrixspermum centipeda Lour., Fl. Cochinch.: 520. 1790; Rchb. f., Xen. Orch. **2**: 121. 1867; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **28** (1, 2): 171. 1975; 中国高等植物图鉴 **5**: 757. 图 8343. 1976; 海南植物志 **4**: 248. 图 1121. 1977; S. Y. Hu, Gen. Orch. Hong Kong: 103, fig. 59. 1977; Seidenf. et J. J. Wood, Orch. Penins. Malay. Singap.: 643. 1992; Z. H. Tsi et S. C. Chen in Acta Phytotax. Sin. **33** (3): 296. 1995. Z. H. Tsi, S. C. Chen et K. Mori, Wild Orch. China: 113, pl. 278. 1997—*Dendrobium auriferum* Lindl., Gen. Sp. Orch. Pl.: 83. 1830. — *Thrixspermum auriferum* (Lindl.) Rchb. f., Xen. Orch. **2**: 121. 1867; Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. **4**: 273. 1919. — *Sarcochilus hainanensis* Rolfe in Kew Bull.: 199. 1896. — *Thrixspermum hainanense* (Rolfe)