

色，其先端斜截并且具2至数个小缺刻；中裂片肉质，深紫色，摊平后呈宽倒卵形或倒卵状椭圆形，长8—13毫米，上部宽6—9毫米，先端钝并且稍2裂，基部具1枚紫色而先端深裂为2叉状的附属物，边缘白色、下弯而形成倒舟状，上面中央具1条纵向脊突，脊突在近唇瓣先端处强烈增厚而隆起；蕊柱淡紫色，长约6毫米，具长约3毫米的蕊柱足；药帽白色，前端稍伸长呈卵状三角形；花粉团2个，近球形，每个劈裂为不等大的2片。蒴果狭长，长达7厘米，粗约6毫米，具长约3厘米的柄。花期4—7月，果期8—9月。

产广西西部（隆林）、贵州西南部（兴义、盘县）、四川西南部至中部（木里、天全、泸定）、云南东南部至中部（文山、屏边、楚雄）、西藏东南部（芒康）。生于海拔800—2150米的山地疏生林中树干上或林下阴湿的岩石上。模式标本采自四川西部。

本种在良好的栽种条件下，花期叶仍茂盛，不出现落叶现象。

5. 滇西蝴蝶兰（中国兰花全书）

Phalaenopsis stobariana Rehb. f. in Gard. Chron. n. s., **8**: 392. 1877; Sweet in Amer. Orch. Soc. Bull. **38**: 235. 1969, et Gen. Phalaenopsis: 46. 1980 (excl. syn. *Pha. hainanensis*); 中国兰花全书: 217. 1998. — *Kingidium stobarianum* (Rehb. f.) Seidenf. in Opera Bot. **95**: 188. 1988.

茎很短，通常具3—4枚叶。叶卵状披针形，斜长圆形或椭圆形，长7—11厘米，宽3—3.4厘米，先端钝并且一侧稍钩转，基部稍收狭，然后扩大成抱茎的鞘，旱季常凋落，花期具叶。花序侧生于茎的基部，1—2个，常斜立，长7—37厘米，不分枝，疏生2—4朵花；花序柄粗2—3毫米，疏生2—3枚鞘；花苞片卵状三角形，长4—5毫米，先端锐尖；花梗和子房长4—4.3厘米；花开展，萼片和花瓣褐绿色；中萼片长圆状椭圆形，长14毫米，宽6毫米，先端钝，基部稍收狭，具5条脉；侧萼片稍斜卵状椭圆形，长14毫米，宽7毫米，先端近锐尖，基部稍收狭并且贴生在蕊柱足上，具5条脉；花瓣椭圆状倒卵形，长14毫米，宽6毫米，先端钝，基部楔形收狭，具5条脉；唇瓣基部具长约1毫米的爪，3裂；侧裂片上半部淡紫色，下半部黄色，直立，狭长，长7毫米，宽3.5毫米，中部稍缢缩，先端斜截形并且扩大，基部（在两侧裂片之间）具1枚2裂的肉突，其中央穴状并且向外（背面）隆起呈乳头状；中裂片深紫色，摊平后倒卵状椭圆形，长8毫米，宽5毫米，向基部楔形收狭，基部具1枚先端深裂为2叉状的附属物，边缘下弯而形成先端喙状的倒舟形，上面中央具1条中部以下较粗的脊突纵贯至先端；蕊柱白色带浅紫红色，长7毫米，基部扩大并且具长约2毫米的蕊柱足；药帽白色；花粉团2个，近球形，每个劈裂为不等大2片。花期5—6月。

产云南西部（盈江）。生于海拔1350米的山地林中树干上。分布于缅甸（模式标本产地）。

6. 版纳蝴蝶兰（中国兰花全书） 版纳蝴蝶兰（植物分类学报） 图版56: 1—6