

兰花全书：216. 1998.

植株簇生。茎长约 1.5 厘米，被宿存而对折的叶鞘所包。叶二列互生，向外弯，长 6.5 厘米，宽 6 毫米，V 字形对折，先端稍斜 2 裂，基部彼此套迭。总状花序密生少数花，具长约 8 毫米的花序柄；花苞片干膜质，卵形、凹的，长 3—4 毫米；花梗和子房长约 5 厘米；花白色，无香气，萼片和花瓣基部以及子房顶端淡粉红色；中萼片长圆形，长 6 毫米，宽 2 毫米，先端短尖；侧萼片斜长圆状倒披针形，长 7 毫米，宽 2 毫米，基部具短爪，先端翘起，背面中肋隆起；花瓣斜长圆形，长 6.5 毫米，宽 1.5 毫米，先端钝；唇瓣 3 裂，侧裂片斜倒披针形；中裂片舌形，长 6.5 毫米，宽 3 毫米，先端钝，稍下弯，基部具 1 枚胼胝体；距弧曲，长 1.1 厘米，粗 1 毫米；蕊柱粗短，长 1.5 毫米。蒴果具 6 个肋。

仅见于我国（无详细地点）。本种已引入欧洲栽培。模式标本存于英国邱园标本馆。本种区别于上种主要在于花较小，无香气，距显著较短。

158. 萼脊兰属 *Sedirea* Garay et Sweet

Garay et Sweet, Orch. South. Ryukyu Isl.: 149. 1974.

附生草本。茎短，具数枚叶。叶二列，稍肉质或厚革质，扁平，狭长，先端钝并且不等侧 2 浅裂，基部无柄。总状花序从叶腋中发出，疏生数朵花；花苞片宽卵形，比花梗连同子房短；花中等大，开展，萼片和花瓣近相似，侧萼片贴生在蕊柱足上；唇瓣基部以 1 个活动关节与蕊柱基部或蕊柱足末端连接，3 裂，侧裂片直立，中裂片下弯，基部有距；距长，向前弯曲并且向末端变狭；蕊柱较长，向前弯，具短的蕊柱足或无蕊柱足；柱头大，深凹陷，位于蕊柱近中部；蕊喙大，下弯，2 裂；花粉团蜡质，2 个，近球形，每个具裂隙；粘盘柄带状，稍向基部变狭，粘盘大。

2 种。分布于我国、日本、朝鲜半岛南部。我国 2 种均产。

本属模式种：*Sedirea japonica* (Linden et Rchb. f.) Garay et Sweet (*Aerides japonica* Linden et Rchb. f.) .

分种检索表

1. 花黄绿色带淡褐色斑点；唇瓣侧裂片大，半圆形；中裂片狭长圆形，全缘 1. 短茎萼脊兰 *S. subparishii* (Z. H. Tsi) Christenson
1. 萼片和花瓣白绿色，唇瓣白色带紫红色；唇瓣侧裂片小，近三角形；中裂片匙形，其前部边缘具不规则的圆齿 2. 萼脊兰 *S. japonica* (Linden et Rchb. f.) Garay et Sweet

1. 短茎萼脊兰 (植物分类学报)