

## 10. 狭叶盆距兰 (新拟)

*Gastrochilus linearifolius* Z. H. Tsi et Garay in *Guihaia* **12** (2): 146, fig. 1 (a-b). 1996. — *G. intermedius* auct. non (Griff. ex Lindl.) Kuntze; 西藏植物志 **5**: 784, fig. 424. 1987.

茎下垂, 细长, 稍高, 长 15—32 厘米, 粗约 5 毫米, 通常分枝, 节间长 1.5—2 厘米。叶二列, 彼此疏离, 线形或狭镰刀状, 长 8—15 厘米, 宽 5—8 毫米, 先端长渐尖并且具 2—3 条似刚毛状、不等长的裂片。伞形花序侧生于茎, 具 3—4 朵花; 花序柄纤细, 长 1—1.5 厘米; 花苞片卵形, 长约 2 毫米, 先端锐尖; 花梗和子房长 5 毫米; 花小, 开展; 中萼片近卵形, 长约 5 毫米, 宽 2.5 毫米, 先端钝; 侧萼片与中萼片相似而较狭; 花瓣长圆形, 比萼片小, 先端钝; 前唇半圆形, 长 2.2 毫米, 宽约 4 毫米, 先端圆形, 边缘具不规则的流苏, 前端内侧具长柔毛, 上面中央的垫状物被细乳突; 后唇近杯状, 长 3.5 毫米, 宽 2.5 毫米, 末端圆形而外侧具 1 条脊突, 上端口缘抬起而比前唇高, 前端具 1 个凹口, 其两侧边缘几乎垂直。 花期 9 月。

产西藏东南部 (墨脱)。生于海拔 1600 米的山坡林中树干上。也产锡金 (模式标本产地)。

本种很近细茎盆距兰 *Gastrochilus intermedius* (Griff. ex Lindl.) Kuntze 区别于后者主要在于前唇边缘具密密的流苏, 前端内侧具长柔毛, 后唇较小。

## 11. 云南盆距兰 (新拟)

*Gastrochilus yunnanensis* Schltr. in *Fedde Repert. Sp. Nov. Beih.* **4**: 76. 1919; Z. H. Tsi in *Guihaia* **16** (2): 141. 1996 — *Saccolabium monticolum* Rolfe ex Downie in *Kew Bull.*: 388. 1925. — *Gastrochilus monticola* (Rolfe ex Downie) Seidenf. et Smith., *Orch. Thailand Prelimin. List* **4** (1): 624, fig. 469. 1963; Seidenf. in *Opera Bot.* **95**: 293, fig. 189. 1988. — *Saccolabium yunnanense* (Schltr.) S. Y. Hu in *Quart. J. Taiwan Mus.* **28** (1, 2): 157. 1975.

茎伸长, 长达 20 厘米, 粗 4—7 毫米, 节间长 1.5—2 厘米。叶二列互生、舌形或长圆形, 长 6—16.5 厘米, 宽 1.5—2.5 厘米, 先端长渐尖并且具 2—3 条芒。伞形花序具 4—15 朵花; 花序柄劲直, 长 1.5—5.5 厘米, 基部被 1—2 枚鞘; 花苞片卵状三角形, 长 1—2 毫米; 花梗和子房长 1 厘米; 萼片和花瓣淡黄色带淡褐色先端; 萼片近等大, 舌状长圆形, 长 5—7 毫米, 宽 2.7—3.5 毫米, 先端钝; 花瓣相似于萼片而较小; 前端宽三角形, 长 2.5 毫米, 宽约 5 毫米, 边缘撕裂状, 上面中央垫状增厚; 垫状物黄色带少数紫红色斑点, 其外围被乳突状毛; 后唇近兜状或半球形, 具白色带紫红色斑点的上端口缘; 口缘比前唇高, 前端具 1 个宽的凹口, 其两侧边缘多少斜立而上方两侧呈齿状三角形。 花期 10 月。

仅见云南南部 (思茅)。生于海拔约 1500 米的密林中树干上。孟加拉国、泰国、越