

产湖南南部(常宁)、台湾中部山区。生于海拔达 2000 米的密林中树干上。

14. 宣恩盆距兰 (云南植物研究)

Gastrochilus xuanenensis Z. H. Tsi in Acta Bot. Yunnan. **4** (3): 269, fig. 1 (7—13). 1982; Z. H. Tsi in Guihaia **6** (2): 143. 1996.

植物体矮小。茎长约 5 毫米, 粗约 2 毫米, 具 4—6 枚叶。叶二列互生, 直立伸展, 长圆形或镰刀状长圆形, 长 2—2.5 厘米, 宽 5—8 毫米, 先端稍尖并且 2—3 小裂, 裂片芒状, 其中 1 条较长。伞形花序具少数花; 花序柄长 5—9 毫米, 粗约 1 毫米, 基部被 1—2 枚杯状鞘; 花苞片卵状三角形, 长 1—2 毫米, 先端急尖; 花梗和子房长约 6 毫米; 花小, 开展; 中萼片倒卵状椭圆形, 长 4 毫米, 宽约 1.5 毫米, 先端锐尖, 具 1 条脉; 侧萼片长圆形或多少斜长圆形, 长约 3 毫米, 宽 1.5 毫米, 先端急尖, 具 1 条脉; 花瓣相似于侧萼片, 近等大; 前唇肾状三角形, 长 2 毫米, 宽 3.5 毫米, 全缘, 上面无毛而中央的垫状物延伸到后唇的前面内壁; 后唇盔状, 末端圆形并且在外侧具 3 条脊突, 上端两侧具呈耳状抬起的口缘; 口缘明显高于前唇, 前端具宽的凹口。花期 5 月。

产湖北西南部(宣恩)、贵州东北部(江口)。生于海拔 500—650 米的山地林缘树干上。模式标本采自湖北。

组 3. 蔓茎组 Sect. Microphyllae (Benth. et Hook. f.) Seidenf. in Opera Bot. **95**: 285. 1988. — *Saccolabium* Bl. sect. Microphyllae Benth. et Hook. f., Gen. Pl. **3**: 579. 1883. — *Saccolabium* Bl. sect. Distichophyllae Hook. f., Fl. Ind. Brit. **6**: 55. 1890.

植株通常匍匐, 少有不垂的; 茎细长而柔弱, 粗常约 2 毫米; 叶小(除 *Gastrochilus fargesii* (Kraenzl.) Schltr. 有时叶长达 4.5 厘米外), 通常长 1—2.5 厘米, 宽不及 1 厘米; 花很小, 萼片通常长不超过 6 毫米。

本组模式种: *Gastrochilus distichus* (Lindl.) Kuntze (*Saccolabium distichum* Lindl.) 我国有 14 种。

15. 小唇盆距兰 (新拟)

Gastrochilus pseudodistichus (King et Pantl.) Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. **12**: 315. 1913; Seidenf. in Opera Bot. **95**: 286, fig. 185. 1988; Averyanov, Vasc. Pl. Syn. Vietnam., Fl. **1**: 100. 1990; Seidenf., l. c. **114**: 439. 1992; Averyanov, Inden Guide Vietnam. Orch.: 391. 1994; Z. H. Tsi in Guihaia **16** (2): 143. 1996. — *Saccolabium pseudodistichum* King et Pantl. in J. As. Soc. Beng. **64** (3): 341. 1895, et in Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta **8**: 229, pl. 305. 1898. — *Saccolabium distichum* auct. non Lindl.; Hook. f. in Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta