

5: 49, pl. 73. 1895, p. p. — *S. hayopse* Rolfe ex Downie in Kew Bull.: 387. 1925.

茎下垂或匍匐，细长，达 28 厘米，粗约 2 毫米，有时分枝，节间长 6—7 毫米。叶绿色带紫红色斑点，二列互生，卵状披针形或长圆形，长 15—27 毫米，宽约 5—6 毫米，先端急尖并且 2—3 小裂呈短芒状，中央 1 条较长；伞形花序具 5—6 朵花；花序柄绿色带紫红色斑点，长 1—2 厘米，上端扩大，基部常被 2 枚鞘；花苞片卵状披针形，长 1—2 毫米，先端急尖；花梗黄绿色连同绿色子房长约 1 厘米；萼片和花瓣黄色带紫红色斑点；萼片近相等大，倒披针状长圆形，长约 3.5 毫米，宽 1.8 毫米，先端钝，具 1 条脉；花瓣近倒卵形，比萼片稍小，先端钝，具 1 条脉；前唇黄色带紫红色，近半圆形，厚肉质，凹的，比后唇狭，宽约 2 毫米，先端钝，全缘，上面光滑无毛；后唇兜状，淡黄色带紫红色斑点，长 3 毫米，宽 4 毫米，上端具与前唇在同一水平面上的截平状口缘；蕊柱长约 2 毫米；药帽前端收狭为翘起的喙状尖头。花期 6 月。

产云南东南部经南部至西部（屏边、麻栗坡、勐海、腾冲）。常生于海拔 1300—1500 米的山地林中树干上或匍匐于灌丛枝干上。分布于锡金、印度东北部、缅甸、泰国。模式标本采自锡金。

16. 红斑盆距兰 红斑松兰（台湾兰）

Gastrochilus fuscopunctatus (Hayata) Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos.: 78. 1917; 台湾植物志 5: 999. 1978; 台湾兰科植物 3: 100. 1986; Z. H. Tsi in Guihaia 16 (2): 143. 1996. — *Saccolabium fuscopunctatus* Hayata, Icon. Pl. Formos. 2: 143. 1912, et 4: 89, fig. 45. 1914; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. 1: 496. 1977; 台湾兰科植物彩色图鉴 1: 303, 496. 1977, et 2: 522, 图. 72. 1990. — *Gastrochilus fuscopunctatus* (Hayata) Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. 4: 288. 1919.

茎常悬垂，长 3—7 厘米，粗约 2 毫米。叶绿色，密布紫红色斑点，二列互生，长圆形或镰刀状长圆形，长 1.5—2.2 厘米，宽 3—5 毫米，先端急尖并且稍 3 小裂。伞形花序常具 1—2 朵花；花序柄长 8—20 毫米，基部被 1—2 枚鞘；花苞片卵状三角形，长 1—2 毫米，先端急尖；花梗和子房长约 7 毫米；萼片和花瓣黄绿色带紫红色斑点；中萼片椭圆形，长 4 毫米，宽 2.3 毫米，先端钝，具 1 条脉；侧萼片斜卵状长圆形，与中萼片等大，先端近急尖，具 1 条脉；花瓣近椭圆形，长 3.2 毫米，宽 2.2 毫米，先端圆形；前唇白色，厚肉质，椭圆状圆形，凹的，长 2.5 毫米，宽 2 毫米，先端钝，全缘，上面光滑无毛而中央增厚的垫状物淡绿色带少数紫红色斑点，在背面中央具 1 条纵向的龙骨状突起；后唇白色，而其末端带紫红色斑点，近兜状，多少两侧压扁，长 5 毫米，上端的口径 3.2 毫米；口缘密布紫红色斑点，向前歪斜，前端无凹口；蕊柱很短，两侧具紫红色斑点；药帽收狭为喙状。花期 1—7 月。

产台湾中部和北部山区。常见于海拔 1000—2500 米的山地密林中树干上。

本种很近于上种，主要区别在于本种的茎较短，叶多少呈镰刀状，萼片和花瓣黄色，唇瓣白色。

17. 列叶盆距兰 (中国高等植物图鉴)

Gastrochilus distichus (Lindl.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. **2**: 661. 1891; Tuyama in H. Hara, Fl. East. Himal. **1**: 435. 1966 et **2**: 187. 1971; 中国高等植物图鉴 **5**: 772. 图 8374. 1976; 西藏植物志 **5**: 787. 图 426. 1987; Z. H. Tsi in Guihaia **16** (2): 144. 1996. —*Saccolabium distichum* Lindl. in J. Linn. Soc. Bot. **3**: 36. 1859; Hook. f., Fl. Brit. Ind. **6**: 64. 1890; King et Pantl. in Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta **8**: 227, pl. 303. 1898; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **28** (1, 2) 150. 1975.

茎悬垂，纤细，通常长 1.5—20 厘米，粗约 2 毫米，常分枝。叶多数，二列互生，与茎交成锐角而伸展，披针形或镰刀状披针形，长 1.5—3 厘米，宽 4—6 毫米，先端急尖并且 2—3 小裂，裂片刚毛状。伞形花序具 2—4 朵花；花序柄纤细，与叶对生，长 1—3 厘米，上端扩大，下部被 2 枚杯状鞘；花苞片卵状披针形，长 1—2 毫米，先端急尖；花梗和子房长约 8 毫米；萼片和花瓣淡绿色带红褐色斑点；萼片相似而等大，通常凹的，长圆状椭圆形，长 4.5—5 毫米，宽 2.5—3 毫米，先端钝，具 1 条脉；花瓣近倒卵形，比萼片稍小，先端钝，具 1 条脉；前唇近半圆形，长 3 毫米，基部宽约 5 毫米，先端钝，边缘全缘，上面光滑无毛而中央增厚成垫状，近基部具 2 枚圆锥形的胼胝体；后唇近杯状，长 4 毫米，末端圆形，具 2—3 毫米的口径，上端口缘抬起并且向前唇基部歪斜，其前端无明显的凹口；蕊柱长约 2.5 毫米；药帽在前端收狭呈喙状并且翘起。

花期 1—5 月。

产云南西部至西南部（龙陵、镇康，大理）、西藏东南部（波密、通麦、察隅）。生于海拔 1100—2700 米的山地林中树干上。分布于尼泊尔、锡金、不丹、印度东北部。模式标本采自锡金。

18. 城口盆距兰 (中国高等植物图鉴)

Gastrochilus fargesii (Kraenzl.) Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. **4**: 288. 1919; 中国高等植物图鉴 **5**: 722, 图 8373. 1976; Z. H. Tsi in Guihaia **16** (2): 145. 1996. —*Saccolabium fargesii* Kraenzl. in J. Bot (Morot) **17**: 423. 1903; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **28** (1, 2): 151. 1975.

茎匍匐状，纤细，长 3—13 厘米，粗约 2 毫米，具多数叶。叶二列互生，狭长圆形或镰刀状长圆形，长 2—4.5 厘米，宽 4—6 毫米，先端锐尖并且具 2—3 小裂，裂片刚毛状。伞形花序具 2—3 朵花；花序柄长 5—10 毫米，上端扩大，下部被 2 枚鞘；花苞片卵状披针形，长 1—2 毫米，先端急尖；花梗和子房长约 2 毫米；花小，萼片和花瓣