

产台湾中部和北部山区。常见于海拔 1000—2500 米的山地密林中树干上。

本种很近于上种，主要区别在于本种的茎较短，叶多少呈镰刀状，萼片和花瓣黄色，唇瓣白色。

17. 列叶盆距兰 (中国高等植物图鉴)

Gastrochilus distichus (Lindl.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. **2**: 661. 1891; Tuyama in H. Hara, Fl. East. Himal. **1**: 435. 1966 et **2**: 187. 1971; 中国高等植物图鉴 **5**: 772. 图 8374. 1976; 西藏植物志 **5**: 787. 图 426. 1987; Z. H. Tsi in Guihaia **16** (2): 144. 1996. —*Saccolabium distichum* Lindl. in J. Linn. Soc. Bot. **3**: 36. 1859; Hook. f., Fl. Brit. Ind. **6**: 64. 1890; King et Pantl. in Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta **8**: 227, pl. 303. 1898; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **28** (1, 2) 150. 1975.

茎悬垂，纤细，通常长 1.5—20 厘米，粗约 2 毫米，常分枝。叶多数，二列互生，与茎交成锐角而伸展，披针形或镰刀状披针形，长 1.5—3 厘米，宽 4—6 毫米，先端急尖并且 2—3 小裂，裂片刚毛状。伞形花序具 2—4 朵花；花序柄纤细，与叶对生，长 1—3 厘米，上端扩大，下部被 2 枚杯状鞘；花苞片卵状披针形，长 1—2 毫米，先端急尖；花梗和子房长约 8 毫米；萼片和花瓣淡绿色带红褐色斑点；萼片相似而等大，通常凹的，长圆状椭圆形，长 4.5—5 毫米，宽 2.5—3 毫米，先端钝，具 1 条脉；花瓣近倒卵形，比萼片稍小，先端钝，具 1 条脉；前唇近半圆形，长 3 毫米，基部宽约 5 毫米，先端钝，边缘全缘，上面光滑无毛而中央增厚成垫状，近基部具 2 枚圆锥形的胼胝体；后唇近杯状，长 4 毫米，末端圆形，具 2—3 毫米的口径，上端口缘抬起并且向前唇基部歪斜，其前端无明显的凹口；蕊柱长约 2.5 毫米；药帽在前端收狭呈喙状并且翘起。

花期 1—5 月。

产云南西部至西南部（龙陵、镇康，大理）、西藏东南部（波密、通麦、察隅）。生于海拔 1100—2700 米的山地林中树干上。分布于尼泊尔、锡金、不丹、印度东北部。模式标本采自锡金。

18. 城口盆距兰 (中国高等植物图鉴)

Gastrochilus fargesii (Kraenzl.) Schltr. in Fedde Repert. Sp. Nov. Beih. **4**: 288. 1919; 中国高等植物图鉴 **5**: 722, 图 8373. 1976; Z. H. Tsi in Guihaia **16** (2): 145. 1996. —*Saccolabium fargesii* Kraenzl. in J. Bot (Morot) **17**: 423. 1903; S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **28** (1, 2): 151. 1975.

茎匍匐状，纤细，长 3—13 厘米，粗约 2 毫米，具多数叶。叶二列互生，狭长圆形或镰刀状长圆形，长 2—4.5 厘米，宽 4—6 毫米，先端锐尖并且具 2—3 小裂，裂片刚毛状。伞形花序具 2—3 朵花；花序柄长 5—10 毫米，上端扩大，下部被 2 枚鞘；花苞片卵状披针形，长 1—2 毫米，先端急尖；花梗和子房长约 2 毫米；花小，萼片和花瓣