

4 毫米，宽 5.5 毫米，先端钝，边缘和上面被白色毛，中央的垫状物黄色；后唇近长圆锥形，两侧稍压扁，长约 2 毫米，向末端稍渐狭并且多少向前弯曲，末端钝，外侧具 1 条浅沟。花期 5 月。

产台湾。生海拔 2 000 米的红松树干上。

本种我们未看到标本，以上描述摘自《台湾兰科植物》(1987) 的记载。

21. 中华盆距兰 (植物研究) 图版 60: 3—6

Gastrochilus sinensis Z. H. Tsi in Bull. Bot. Res. **9** (2): 23. fig. 2 (3—6). 1989; Z. H. Tsi in Guihaia **16** (2): 147. 1996.

茎匍匐状，细长，长 10—20 厘米或更长，粗约 2 毫米。叶绿色带紫红色斑点，二列，彼此疏离，互生，与茎交成 90 度角而伸展，椭圆形或长圆形，长 1—2 厘米，宽 5—7 毫米，先端锐尖并且稍 3 小裂，基部具极短的柄。总状花序缩短呈伞状，具 2—3 朵花；花序柄纤细，长约 1 厘米，上端扩大，下部被 2—3 枚杯状鞘；花苞片卵状三角形，长约 1 毫米；花梗连同子房黄绿色带紫红色斑点，长约 7 毫米，具条纹；花小，开展，黄绿色带紫红色斑点；中萼片近椭圆形，凹的，长 4—5 毫米，宽约 2.5 毫米，先端钝，具 3 条脉；侧萼片稍斜长圆形，与中萼片等大，先端钝，具 1 条脉，在背面中肋多少隆起；花瓣近倒卵形，比萼片小，先端近圆形，具 3 条脉，仅中脉到达先端；前唇肾形，长 2.5 毫米，宽 4—5 毫米，先端宽凹缺，边缘和上面密布短毛，中央具增厚的垫状物；后唇近圆锥形，多少两侧压扁，长 3.5—4 毫米，宽约 3 毫米，末端圆钝并且稍向前弯曲，上端的口缘稍抬起而稍比前唇高；口缘的前端具宽的凹口，内侧密被髯毛；蕊柱长约 2 毫米；药帽前端收窄呈狭三角形。花期 10 月。


产浙江西北部 (昌化)、贵州东北部 (江口)、云南西北部 (贡山)。生于海拔 800—3200 米的山地林中树干上或山谷岩石上。

本种十分近于日本的 *Gastrochilus ciliaris* Maekawa，但后者的叶无紫红色斑点，后唇无毛，仅前唇上面被细乳突状毛。

22. 红松盆距兰 (新拟) 红桧松兰 (台湾兰艺) 图版 60: 8

Gastrochilus raraensis Fukuyama in Bot. Mag. Tokyo **48**: 441. 1934; 台湾兰科植物 **3**: 119, 120 (图). 1987; Z. H. Tsi in Guihaia **16** (2): 147. 1996; 台湾兰科植物彩色图鉴 **2**: 526. 1996. — *Saceolabium raraense* (Fukuyama) S. Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus. **28** (1, 2): 152. 1975. — *Gastrochilus toramanus* auct. non (Makino) Schltr.; 台湾植物志 **5**: 1001. 1978.

茎匍匐状，通常长 2—10 厘米。叶绿色带紫红色斑点，二列互生，长圆形或长椭圆形，长 1.5—2.6 厘米，宽 5—7 毫米。先端急尖并且稍 3 小裂。伞形花序具 3—4 (—7) 朵花；花序柄短，长 8—10 毫米；花梗和子房长 5—6 毫米；花小，不甚开展，萼片和花瓣黄绿色带紫红色斑点；萼片相似，近椭圆形，长 3.5—4.5 毫米，宽 1.7—2.5 毫



图版 60 1—2. 镰叶盆距兰 *Gastrochilus acinacifolius* Z. H. Tsi: 1. 植株, 2. 花的正面观。3—6. 中华盆距兰 *G. sinensis* Z. H. Tsi: 3. 植株, 4. 花正面观, 5. 花粉块, 6. 显示一枚叶在中部以上的形态。7. 黄松盆距兰 *G. japonicus* (Makino) Schltr.: 花的正面观。8. 红松盆距兰 *G. raraensis* Fukuyama: 花的正面观。

(张泰利绘)