

## 1. 狭叶瓶尔小草(中国主要植物图說, 蕨类植物門) 图版 I, 1—3

**Ophioglossum thermale** Kom. in Fedde, Repert. sp. nov. XIII (1914) 85; C. Chr. Ind. Fil. Suppl. II (1916) 24; Kom. Fl. Kamtsch. I (1927) t. 2; Fomin in Kom. Fl. URSS. I (1934) 93, t. 3, f. 10; H. Ito, Fil. Jap. Illustr. (1944) t. 504; 王薇等, 东北草本植物志, 第一卷 (1958) 22 頁, 21 图——*Ophioglossum vulgatum* var. *thermale* C. Chr. in Hultén, Fl. Kamtsch. (1927) 45; Fomin in Busch. Fl. Sibir. et Orient. Extr. V (1930) 201——*Ophioglossum japonicum* Prantl in Berl. Deutsch. Bot. Ges. I (1883) 353; in Jahrb. Bot. Gard. u. Mus. Berl. III (1884) 327, t. 8, f. 29; Diels in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. I, iv (1899) 468; C. Chr. Ind. Fil. (1905) 471; Dunn & Tutch. Fl. Kwangt. & Hongk. in Kew Bull. Add. Ser. X (1912) 356, non Thunb. 1784——*Ophioglossum angustatum* Maxon in Proc. Biol. Soc. Wash. XXXVI (1923) 169; DeVol, Ferns East Centr. China in Notes Bot. Chin. Mus. Heude, No. 7 (1945) 50; 傅书遐, 中国主要植物图說(蕨类植物門) (1957) 16 頁——*Ophioglossum nipponicum* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXIX (1925) 193, non Miyabe et Kudo, 1916——*Ophioglossum savatieri* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XL (1926) 374——*Ophioglossum nudicaule* Christ in Bull. Herb. Boiss. IV (1896) 675——*Ophioglossum vulgatum* auct. pluri. plant. Japonicae et Chinae——*Ophioglossum litorale* Makino in Journ. Jap. Bot. VI (1929) 27.

根状莖細短, 直立, 有一簇細長不分枝的肉質根, 向四面橫走如匍匐莖, 在先端发生新植物。叶单生或 2—3 叶同自根部生出, 总叶柄长 3—6 厘米, 纤细, 綠色或下部埋于土中, 呈灰白色; 营养叶为单叶, 每梗一片, 无柄, 长 2—5 厘米, 寬 3—10 毫米, 倒披針形或长圓倒披針形, 向基部为狭楔形, 全緣, 先端微尖或稍鈍, 草質, 淡綠色, 具不明显的网状脉, 但在光下則明晰可見。孢子叶自营养叶的基部生出, 柄长 5—7 厘米, 高出营养叶, 孢子囊穗长 2—3 厘米, 狭綫形, 先端尖, 由 15—28 对孢子囊組成。孢子灰白色, 近于平滑。

产于东北、河北、陝西、四川、云南、江西(庐山)及江苏。生山地草坡上, 或温泉附近。苏联远东区堪察加半島、朝鮮及日本也产。

药用, 主治无名肿毒。

## 2. 小叶瓶尔小草

**Ophioglossum parvifolium** Grev. et Hook. in Hook. Bot. Misc. III (1833) 218; Kze. Farnkt. I (1840) t. 29; Bedd. Ferns S. Ind. (1873) t. 71; C. Chr.

