

齿较为明显,故可区别。

6. 华中瘤足蕨(中国植物分类学报,第七卷)

Plagiogyria euphlebia Mett., Farngatt. *Plagiogyria* (1858) 10; Makino in Bot. Mag. Tokyo VIII (1894) 334; Diels in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. I, iv (1899) 282; Christ in Bull. Acad. Géogr. Bot. Mans. XI (1902) 232; Matsumura, Ind. Pl. Jap. I (1904) 332; C. Chr. Ind. Fil. (1905) 495, pro parte; Hay. Ic. Pl. Form. IV (1914) 239; Hand-Mazz. Symb. Sinic. VI (1929) 38; Ogata, Ic. Fil. Jap. IV (1931) t. 184; DeVol, Ferns East. China in Notes Bot. Chin. Mus. Heude No. 7 (1945) 57; Ching in Acta Phytotax. Sinica VII (1958) 117, t. 31, f. 1——*Lomaria euphlebia* Kze. in Bot. Zeit. (1848) 521; Hook. Sp. Fil. III (1860) 20; Hook. et Bak. Syn. Fil. (1867) 183, pro parte.

根状茎粗大,圆柱形,弯生。不育叶的柄长23—30厘米,粗约2—2.5毫米,基部以上通体不具气囊体或在顶部间有一对气囊体;叶片长32—45厘米,宽13—18厘米,长圆形,基部不变狭,奇数羽状;羽片14—16对,近对生或互生,相距2—2.5厘米,斜向上,披针形,略呈镰刀状,通常长9—11厘米,宽1—1.3厘米,渐尖头,基部为短楔形,有短柄,顶生一枚同形,几同大,基部常有1—2个圆形裂片,其下方2—3枚经常多少与叶轴合生,基部1—2对同大或略短,平展,有较长的柄(长约3毫米),边缘下部几为全缘,向上有浅波状的疏而低的齿牙,先端有钝锯齿。叶脉稀疏,略斜上,单一或二叉,直达叶边,两面明显隆起。叶为纸质,光滑,干后为褐绿色或棕绿色。能育叶较高,柄长达50厘米;叶片30—40厘米;羽片长8—10厘米,线形,有长柄,急尖头。

产于浙江南部、福建、台湾、广东、江西、皖南、湖南、贵州、四川、云南。生山地林下,海拔500—1200米,也广泛分布于日本、朝鲜、缅甸、印度北部。

我国东南部的标本完全同日本的一样,而我国西南部(贵州、四川和云南)及印度的标本则比华中和华东的为大,羽片长12—15厘米,宽达1.5厘米,相距3.5厘米,干后为褐绿色或黑褐色,可以作为一个地理的变种: var. **triquetra** (Wall.) Ching in Acta Phytotax. Sinica VII (1958) 117.

7. 峨眉瘤足蕨(中国蕨类植物图谱,第四卷)

Plagiogyria assurgens Christ in Bull. Soc. Bot. Ital. (1901) 293; C. Chr. Ind. Fil. (1905) 495; Cop. in Philip. Journ. Sci. XXXVIII (1929) 398; Ching Ic. Fil. Sinic. IV (1937) t. 155; in Acta Phytotax. Sinica VII (1958) 117——*Lomaria deflexa* Baker in Journ. Bot. (1888) 226, non Col. 1844, nec Liehm. 1849——*Blechnum*