

3—4 个孢子囊組成。

特产于云南西部(大理蒼山和漾濞、永平一带)。生于山区火烧跡地和松林下。

6. 光里白(中国主要植物图說, 蕨类植物門) 图版 IX, 1—5

Hicriopteris laevis (Christ) Ching in Sunyatsenia V (1940) 280; Cop. Gen. Fil. (1947) 29; 傅书遐, 中国主要植物图說(蕨类植物門)(1957) 33 頁, 38 图——*Gleichenia laevis* Christ in Bull. Acad. Géogr. Bot. Mans (1902) 268; C. Chr., Ind. Fil. (1905) 322; Ching, Ic. Fil. Sinic. IV (1937) t. 152; Tard.-Blot et C. Chr. in Fl. Indo-Chine VII, ii (1939) 45; DeVol, Ferns East Centr. China in Notes Bot. Chin. Mus. Heude No. 7 (1945) 53——*Dicranopteris laevis* Nakai in Bot. Mag. Tokyo. XLI (1927) 692; Ito, Fil. Jap. Illustr. (1944) t. 485——*Gleichenia kiusiana* Makino in Bot. Mag. Tokyo XVIII (1904) 139.

植株高 1—1.5 米。根状莖横走, 圓柱形, 被鱗片, 暗棕色。叶柄綠色或暗棕色, 下面圓, 上面平, 有沟, 基部以上粗 4—5 毫米, 基部被鱗片或疣状突起, 其他部分光滑; 一回羽片对生, 具短柄(长 2—5 毫米), 卵状长圓形, 长 38—60 厘米, 中部寬达 26 厘米, 頂漸尖, 基部稍变狹或不变狹; 小羽片 20—30 对, 互生, 几无柄, 相距 2—2.8 厘米, 显然斜向上, 中部的最长, 达 20.5 厘米, 狭披針形, 向頂端长漸尖, 基部下側显然变狹, 羽状全裂; 裂片 25—40 对, 互生, 向上斜展, 长 7—13 毫米, 寬約 2 毫米, 基部下側裂片長約 5 毫米, 披針形, 頂銳尖, 基部分离, 缺刻尖, 邊緣全緣, 干后內捲。中脉上面平, 下面凸起, 側脉两面明显, 两叉, 斜展, 直达叶緣。叶坚紙質, 无毛, 上面綠色, 下面灰綠色或淡綠色。叶軸干后綠禾稈色, 背面圓, 腹面平, 有边, 光滑。孢子囊羣圓形, 位于中脉及叶緣之間, 着生于上方小脉上, 由 4—5 个孢子囊組成。

产浙江、安徽(黃山)、湖北(利川)、福建、江西(庐山、武功山)、湖南(衡山)、广西(龙胜)、湖南、貴州、四川(峨眉)、云南西部(隆陵)。生山谷中阴湿处, 海拔 500—2500 米。日本、越南北部、菲律宾也有分布。

7. 粵里白

Hicriopteris cantonensis (Ching) Ching in Sunyatsenia V (1940) 279——*Gleichenia cantonensis* Ching in Lingnan Sci. Journ. XV (1936) 391 et Ic. Fil. Sinic. IV (1937) t. 151.

植株高約 3 米。根状莖横走。叶柄高达 2 米, 紅棕色, 光滑; 一回羽片对生, 具短柄(长 5—15 毫米), 长圓形, 长达 80 厘米, 寬約 40 厘米或过之, 向上端变狹; 小羽片約 35 对, 近对生或互生, 相距 1.5—2.4 厘米, 开展, 具短柄(长 1 毫米), 中部的最长,