

米,两侧有闊翅,口部深裂为明显的两唇瓣,唇瓣三角形,长与寬相等,尖头或鈍头,其基部稍寬于囊苞的管,囊羣托突出,长2—3毫米,黑褐色。

产于台湾、广东、海南島(五指山)及云南。生长在阴湿的岩石上。除我国南部外,从非洲东部的馬达加斯加島到南太平洋的塔希提島,包括印度、馬來半島、印度支那、婆罗洲、热带澳洲、新西兰等地均有分布,向北达于日本。

2. 边内假脉蕨

Crepidomanes intramarginale (Hook. et Grev.) Cop. in Philip. Journ. Sci. LXVII (1938) 59——*Trichomanes intramarginale* Hook. et Grev. Ic. Fil. (1831) t. 211; Bedd. Ferns S. Ind. (1864) t. 208; Handb. Ferns Brit. Ind. (1883) 41; Dunn & Tutch. Fl. Kwangt. & Hongk. in Kew Bull. Add. Ser. X (1912) 336; Cop. l. c. LI (1933) 189, t. 23, f. 1—3.

植株矮小,高仅2—4厘米。根状莖纤细,絲状,粗仅約0.2毫米,横走,暗褐色,几光滑。叶远生,相距5—10毫米;叶柄很短,长2—4毫米,暗褐色,几光滑,两侧有狭翅几达基部;叶片綫状披針形,长2—4厘米,寬0.5—1厘米,先端漸尖,一回羽裂或略为二回分裂;羽片5—7对,互生,相距3—4毫米,斜向上,长圓綫形,长3—4毫米,寬約1.5—2.5毫米,鈍头,基部下側下延,浅裂成2—3个綫形鈍头的裂片;末回裂片长1.5—3毫米,寬0.5—0.8毫米,密接,全緣而略呈波浪状。叶脉叉状,暗褐色,两面稍隆起,无毛,末回裂片有小脉1条,沿叶緣有1条連續不断的假脉,这假脉与叶緣之間有1—2行細胞相隔,連續的假脉与叶脉間尚有断續的假脉分散于叶肉中。叶为薄膜質,半透明,干后暗褐色,光滑无毛。叶軸暗褐色,全部有狭翅,无毛。孢子囊羣生在长裂片基部下側的短裂片頂端,每个羽片只生1个孢子囊羣;囊苞钟状,長約1毫米,两侧有闊翅,其下的裂片不縮狭,口部浅裂为两个圓头的唇瓣;囊羣托突出。

产于广东,香港。印度及錫兰也有分布。

3. 海南假脉蕨 (中国植物分类学报,第八卷)

Crepidomanes hainanense Ching in Acta Phytotax. Sinica VIII (1959) 137.

小形附生植物,植株高約2—3厘米。根状莖横走,纤细如絲状,黑褐色,密被黑褐色开展的短毛。叶稍远生,相距3毫米以上;叶柄长2—10毫米,纤细如絲状,灰褐色,光滑无毛;叶片楔形至狭綫形或略呈扇形,长1—2厘米,寬3—8毫米,分裂图式不一,或为具两个綫形裂片的单叶,或几为一回羽状分裂,或略为扇状分裂,基部楔形而下延;裂片綫形,长1.5—8毫米或更长,基部寬0.6—0.8毫米,先端稍狭而略为尖头,基部最寬,全緣,各裂片接近,其先端大部指向叶的頂部,缺刻銳尖或仅为一狭縫。叶