

云、徭山)、四川(峨眉山)、云南(車里、南嶠)。 生长在山地林下阴湿的岩石上或附生于树干上,海拔 600—1950 米。除我国上述地区外,印度北部、阿薩姆及越南也有分布。

15. 皺叶假脉蕨

Crepidomanes plicatum (v. d. B.) Ching, comb. nov.——*Didymoglossum plicatum* v. d. B. in Ned. Kr. Arch. V (1863) 139; Cop. in Philip. Journ. Sci. LI (1933) 193——*Trichomanes plicatum* Bedd. Ferns Brit. Ind. (1868) t. 285; C. Chr. Ind. Fil. (1905) 647; Tard.-Blot et C. Chr. in Fl. Indo-Chine VII, ii (1939) 65——*Trichomanes bipunctatum* var. *plicatum* Bedd. Handb. Ferns Brit. Ind. (1883) 42.

植株高 6—14 厘米。根状茎細长,粗 0.6—1 毫米,横走,黑褐色,密被黑褐色的短毛,常在叶柄腋間分枝。叶远生,相距 2—5 厘米;叶柄长 1.5—2.5 厘米,粗 0.5—0.8 毫米,暗綠褐色,上下扁平,无翅或頂部稍具下延的狭翅,光滑无毛;叶片三角形至卵形或卵状长圓形,长 4—10 厘米,寬 3—5 厘米,先端漸尖,基部近心脏形,三回羽裂;羽片 10—12 对,下部 1—3 对几对生,其余的互生,无柄或几无柄,下部的平展,上部的斜向上,三角状卵形至卵状长圓形,长 1—3 厘米,寬 5—18 毫米,先端鈍,基部闊斜楔形,上部的密接,下部的間隔 3—5 毫米,深羽裂达有闊翅的羽軸;小羽片 3—6 对,互生,无柄,斜向上,闊楔形至近于扇形,长 4—8 毫米,寬 3—5 毫米,先端鈍圓,基部下側下延,相距 2—4 毫米,深羽裂几达有闊翅的小羽軸;末回裂片 2—6 个或更多,极斜向上,狭綫形,长 1—3 毫米,寬 0.4—0.6 毫米,密接,鈍头或尖头,全緣,多少为浅波浪状或有褶皱,单一或分叉。叶脉叉状分枝,两面明显稍隆起,暗褐色,无毛,沿叶緣无連續不断的假脉,叶肉間有 1—2 行較长的断續假脉,假脉和叶脉并行或几并行。叶为薄膜質,半透明,干后淡褐色至暗綠褐色,无毛;叶軸及羽軸淡黑褐色,稍曲折,无毛,全部均有翅,翅的边緣有波浪状褶皱。孢子囊羣生在叶片的上半部,着生于向軸的短裂片頂端,每羽片有 1—6 个;囊苞橢圓形,长约 1.5 毫米,寬約 1 毫米,兩側无翅,其下的裂片不縮狹,口部不膨大或稍膨大,浅裂达 1/3 或过之成为两唇瓣,唇瓣三角形,长与寬約相等,尖头或几为尖头;囊羣托突出,长约 2 毫米,褐色,通直。

产于云南(德欽、貢山、維西、丽江、邓川、蒙自、金平),未見于我国其他地区,为云南各地山区常見的种,生在山谷溪边阴湿的岩石上,海拔 2000—2800 米。除我国云南外,印度、錫兰、越南及印度尼西亚(麻六甲、苏門答臘)等地也有分布。

16. 寬叶假脉蕨