

軸几光滑,羽軸上也有同样的毛密生。孢子囊羣小,每小羽片上边 3—5 个,下边 2—4 个,位于缺刻的基部;囊羣盖极小,圓形,也有与叶片上同样的毛疏生。

特产在安徽南部(黄山)。

6. 毛果鳞盖蕨

Microlepia trichocarpa Hay. Ic. Pl. Form. IV (1914) 210, f. 142; C. Chr. Ind. Fil. Suppl. II (1917) 23.

根状莖粗而横走,粗約 5 毫米,黑褐色,密被紅褐色針状毛。叶疏生,柄长 25—35 厘米,粗約 3—4 毫米,褐棕色,下面圓形,上面有一条深而狹的縱沟,密被开展的灰白色长針状毛,有粗糙的痕;叶片长 35—58 厘米,寬 22—30 厘米,长圓形,尾状漸尖,二回羽状;羽片 18—25 对,互生,几开展,有短柄(长 3—5 毫米),远离,基部的不縮短,相距 5—6 厘米,披針形,漸尖头,长 12—18 厘米,寬 3.2—3.6 厘米,基部近截形,并与叶軸并行,一回羽状;小羽片 20—30 对,接近,平展,长圓形,圓头或鈍头,基部不等,下側楔形,上側为截形,略呈耳状,几无柄,两边浅裂达 $1/3$ — $1/2$ 处,小裂片闊,頂端有一二粗鈍齿。羽片向叶片的頂部逐漸縮短,先端为一回羽状的长漸尖头或几为尾状。叶脉两面可見,在小裂片的为羽状,小脉单一。叶为草質,干后褐綠色,两面有长針状的伏貼灰色毛密生,叶軸及羽軸也有同样而較长的毛密生,开展。孢子囊羣每小羽片上边 5—6 个,下边 3—4 个,位于缺刻的基部;囊羣盖杯形,有灰色針状长毛密复,几不可見。

特产台湾台北附近山地,海拔 1250 米。

7. 刚毛鳞盖蕨

Microlepia hispida C. Chr. in Bull. Mus. Paris. sér. 2, VI (1934) 104; C. Chr. Ind. Fil. Suppl. III (1934) 127——*Microlepia pseudostrigosa* Tard.-Blot et C. Chr. in Fl. Indo-Chine VII, ii (1939) 96, non Makino 1914.

根状莖横走,被紅棕色針状毛,曲卷。叶远生,柄长 30—70 厘米,与叶軸同密被长卷毛,脫落后有粗糙的痕;叶片长 30—45 厘米,寬 20—25 厘米,三角形或卵圓三角形,二回羽状;基部羽片几对生,其余互生,下部的有短柄,上部的几无柄,长 10—15 厘米,寬 2—3 厘米,披針形,鐮刀状,基部圓形,先端长漸尖,一回羽状;小羽片 15—20 对,密接,长 1—2 厘米,寬 5—8 毫米,鐮刀形,基部下側下延,上側截形,多少呈耳状,急尖,几为全緣,或上緣圓浅裂。叶脉細,两面可見,在圓齿中为 2—3 对,羽状或分叉。叶草質,坚实,干后呈褐綠色,上面有少数长針状毛生于叶脉上,叶下各脉密被灰棕色长針状毛,脉間也被有短毛,羽軸也密被长毛。孢子囊羣小形,囊羣盖杯形,棕色,密