

植株高 65 厘米。根状茎横走，黑褐色，被棕褐色长针状毛。叶疏生，柄长 25 厘米，粗约 2 毫米，褐棕色，下面圆形，上面有一条纵沟，近基部疏被棕褐色长针状毛，上部与叶轴同被微毛；叶片长 43 厘米，宽 16 厘米，狭长圆形，先端渐尖，二回羽状；羽片 10 对，近互生，开展，有短柄（长 2 毫米），远离，相距 8 厘米，基部一对不缩短，披针形，长 15 厘米，宽 4—4.5 厘米，基部不对称，上侧截形，与叶轴并行，先端渐尖，一回羽状；小羽片 20 对左右，接近，开展，长 2—2.4 厘米，宽 8 毫米，上侧一二片较长，直立，长圆形，钝头，基部不等，上侧截形，与羽轴并行，下侧楔形，先端有一二粗钝齿，基部多少下延，几无柄，羽状深裂，小裂片全缘。叶脉两面明显，在小裂片为羽状，小脉单一或分叉。叶膜质，干后草绿色，两面仅有少数长针状的灰白毛疏生于叶脉上，叶轴淡棕色，和羽轴及中肋密被短柔毛。孢子囊羣小，囊羣盖肾形，仅基部着生，膜质，淡绿色，无毛。

产云南新平县（大坝，多瓦，白果河）。生河边林下阴湿地，海拔 1000 米。

为一突出的种类，其叶几为膜质，干后绿色，囊羣盖为肾形，基部着生，易误认为金星蕨的一种。

13. 金果鳞盖蕨 黄胞鳞蕨（中国蕨类植物图谱，第一卷）

Microlepia chrysocarpa Ching in *Sinensia* I (1929) 3; *Ic. Fil. Sinic.* I (1930) t. 18; *C. Chr. Ind. Fil. Suppl.* III (1934) 127.

植株高 60 厘米。根状茎长而横走，直径 3—4 毫米，密被褐红色长毛。叶远离；叶柄长 32—40 厘米，粗与根状茎同，褐色，稍有光泽，基部密被褐红色长毛，上部被短毛；叶片长圆卵形，长 35—42 厘米，宽 10—12 厘米，先端渐尖，三回羽状深裂；羽片 14—17 对，互生，接近，常呈复瓦状，斜展，有柄（长约 5 毫米），阔披针形，长 10—12 厘米，宽 4—4.5 厘米，先端渐尖，基部不等，上侧截形，下侧楔形，二回羽状深裂；一回小羽片 14—17 对，接近，斜展，有小短柄，长圆披针形，长 2—2.5 厘米，宽 7—10 毫米，先端渐尖，基部不等，上侧截形而与羽轴并行，下侧楔形，羽状深裂；小裂片 6 对，密接，斜展，长圆形，长 5—7 毫米，宽 3—4 毫米，先端钝，边缘有圆齿状齿牙。叶脉在小裂片上羽状，4—5 对，细脉叉分，两面明显。叶草质，干后呈褐绿色；叶轴及羽轴密被短毛，叶两面光滑无毛，惟小羽轴上下两面略被短毛。孢子囊羣小形，每小裂片上 4—6 枚，顶生于分叉细脉的向顶的一条上；囊羣盖棕色，浅杯状，几无毛，离叶缘远。

产广西西部（河池）及西北部（罗城）。生石灰岩脚阴湿地，海拔 300—500 米。

14. 岭南鳞盖蕨 图版 XVII, 11

Microlepia matthewii Christ in *Lec. Not. Syst.* I (1909) 54; *C. Chr. Ind.*