

特产四川峨眉山山麓,伏虎寺附近林下,海拔 500 米。

23. 海南鳞盖蕨(中国植物分类学报,第八卷)

Microlepidia hainanensis Ching, sp. nov.——*Microlepidia subpinnata* Ching in Acta Phytotax. Sinica VIII (1959) 140, non Hay. 1914.

植株高 70 厘米。根状茎长而横走,粗约 4 毫米,密被暗红棕色长毛。叶远生,柄长 30 厘米,基部粗 3.5 毫米,褐禾稈色,被同样的毛,以上渐脱落而有粗糙的斑痕,下面圆,上面有沟;叶片长约 40 厘米,宽 25—28 厘米,长圆形,先端长渐尖,基部不缩短或稍缩短,二回羽状;羽片约 20 对以上,开展,基部对生,上部互生,相距 5—8 厘米,下部羽片较长,16—20 厘米,宽 2.5—3 厘米,线形,先端渐尖,有柄(长约 3 毫米),基部稍宽,不对称,下侧楔形,上侧直截,而与叶轴并行,一回羽状;小羽片 25 对左右,密接,开展,近长圆形,长 18—22 毫米,宽约 9 毫米,钝头,基部下侧楔形,上侧斜截形,上边缘有浅裂或少数缺刻。叶脉两面隆起,在小羽片的上侧基部二三组为羽状,其余为分叉。叶为草质,干后绿色,叶轴与羽轴密被棕色短毛,上面各脉疏被一二刚毛,下面各脉及叶肉上被棕色短毛。孢子囊群小,近叶缘生,每小羽片上有 7—15 个,上边 5—9 个,下边 2—6 个;囊群盖浅杯形,棕色,膜质,被褐色短毛。

产于海南岛(儋县,红毛山)。生溪边石上。

24. 光盖鳞盖蕨

Microlepidia glabra Ching, sp. nov.

植株高 50 厘米。根状茎长而横走,粗约 3 毫米,密被红褐色刚毛。叶远生,相距约 1 厘米;柄长 13.5 厘米,粗约 3 毫米,褐禾稈色,基部被有开展的灰色长针状毛,上部脱落,有粗糙的疏斑痕;叶片卵圆形,长 37 厘米,宽 20 厘米,先端渐尖,基部近圆形,二回羽状;羽片 16 对以上,基部的近对生,上部的互生,相距 3.5 厘米,开展,有柄(长 3 毫米),线形,镰刀状,长 16.5 厘米,宽 2.3 厘米,先端长渐尖,基部不对称,上侧平截,而与叶轴并行,下侧狭楔形,一回羽状;小羽片 17 对,基部上侧 1 枚最大,近菱形,长达 2.7 厘米,宽达 1.1 厘米,先端急尖,有尖头,基部不对称,上侧截形,与羽轴并行,下侧狭楔形,边缘有浅缺刻,每缺裂有少数齿牙。叶脉下面隆起,上面可见,在浅缺裂上为羽状,2—3 对,细脉分叉或单一。叶草质,干后呈灰绿色,上下面均无毛;叶轴及羽轴下面密被褐色短毛,上面光滑。孢子囊群小,每小羽片 3—5 枚,着生缺刻基部,生于上侧脉顶端;囊群盖杯形,棕色,光滑。

产四川东部(重庆,歌乐山)。

25. 新粗毛鳞盖蕨

Microlepia neostrigosa Ching, sp. nov.

植株高 83 厘米。根状茎长而横走,密被暗栗色长针状硬毛,有光泽。叶远生,叶柄长 37 厘米,基部粗 4 厘米,褐禾稈色,基部被有暗栗色长针状硬毛,向上稀疏,有粗糙的痕,叶轴禾稈色,也被灰色长硬毛;叶片长圆形,长达 46 厘米,宽达 24 厘米,先端渐尖,基部不缩短,二回羽状;羽片 23 对,基部近对生,上部互生,相距 5.5 厘米,斜展,有柄(长 3 毫米),披针形,长 13—14 厘米,宽 3—3.8 厘米,先端长渐尖,基部广楔形,近对称,上侧几为截形,下侧稍缩短,一回羽状;小羽片 18 对以上,阔披针形,长 2—2.5 厘米,宽 1.8—1.9 厘米,先端急尖,基部不对称,上侧截形,而与羽轴并行,下侧狭楔形,羽状深裂达于 2/3 处,裂片为全缘,或先端有一二个疏齿牙。叶脉纤细,两面明显,在裂片上为羽状,2—3 对,细脉单一,或少有分叉的。叶草质,干后呈绿色,两面沿叶脉上有针状灰色长毛疏生,尤以上面为少,叶轴及羽轴均密被淡棕色的长硬毛和短毛。孢子囊羣小,每裂片基部 1 枚,生于缺刻基部;囊羣盖杯形,棕色,被发亮的长硬毛。

特产云南南部(西双版纳)。

26. 团羽鳞盖蕨

Microlepia obtusiloba Hay. in Bot. Mag. Tokyo XXII (1909) 27; C. Chr. Ind. Fil. Suppl. I (1913) 51——*Microlepia pseudo-strigosa* var. *tripinnata* Tard.-Blot et C. Chr. in Fl. Indo-Chine VII, ii (1939) 96——*Microlepia parastrigosa* Ching in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. new ser. I (1949) 302.

根状茎横走,粗约 4 毫米,密被暗红棕色刚毛。叶远生,柄长 40 厘米,粗约 3 毫米,棕禾稈色,通体有开展的灰色长针状毛并有粗糙的痕;叶片长 40—45 厘米,宽约 2.2 厘米,长卵形,先端急长渐尖头,并为一回羽状;下部为三回羽状深裂,中部为二回羽状,基部一对较长,斜向上,有柄(长约 1 厘米),长达 20 厘米,宽约 5 厘米,披针形,渐尖头,基部相等,圆楔形,二回羽状深裂;羽状深裂的小羽片在一回羽状的渐尖头顶部分约为 9 对,长 2.5 厘米,宽 1.2 厘米,长圆形,钝头,有粗齿牙,基部不对称,下侧楔形,上侧直截并与羽轴并行,略呈耳状,羽状深裂几达小羽轴;末回裂片 3—4 对,长圆形,圆头,有少数齿牙。上部的羽片为披针形,宽约 2 厘米,一回羽状,小羽片为长圆形,圆钝头,密接。叶脉两面明显,在末回裂片为 2—3 对,斜向上,单一。叶为厚纸质,干后为褐色,上面无毛,下面沿中脉及小脉有相当多的棕色长刚毛;叶轴及羽轴上有较多开展的棕色刚毛。孢子囊羣圆形,小,生于裂片上侧的缺刻底部,每裂片一个,基部下侧裂片较大,常有 2 个;囊羣盖杯形,棕色,有毛。

产台湾、云南东南部(屏边县大围山)及西南部。越南北部接近云南交界处也有

11, 1929.

23. **Microlepia glabra** Ching, sp. nov.

Species *M. criticae* Ching valde affinis differt statura minor, graciliore, lamina utrinque glabra, praeterea indusiis glabris.

Rhizomate late repente, 3 mm crasso, pilis atro-rufis setaceis dense oblecto; frondibus solitariis vel approximatis, stipite gracili, ca. 2 mm diametro, fusco-brunneo, 10 cm longo, ad basin dense strigoso, sursum nudescente, scaberulo; lamina 30 cm longa, 17 cm lata, ovato-oblonga, acuminata, bipinnata; pinnis ca. 14-jugis, obliquis, alternis, 3 cm inter se remotis, inferioribus parum abbreviatis, sequentibus longioribus, mediis 12—13 cm longis, 2.4 cm basi latis, lanceolatis, subfalcatis, acuminatis, basi utrinque latere inaequaliter cuneatis, brevipetiolatis (petiolo ca. 2 mm longo), pinnatis; pinnulis infra apicem pinnatifidum acuminatum ca. 14-jugis, contiguis, basali anteriori majore, 2—2.2 cm longa, 9 mm basi lata, oblonga, subobtusata, rachidi parallela, sequentibus minoribus, apice acutis vel subacutis, dimidiato-subrhomboideis, basi anteriori rectis, costae parallelis, margine inferiore rectis, integris, superiore infra apicem dentatum leviter lobulatis, lobulis dentatis; nervis utrinque prominulis, in lobulis pinnatis; textura herbacea, colore in sicco obscure virente, paginis utrisque glabris; soris ad sinum positis, secus marginem superiorem 2—3, inferiorem 1—2, vel saepe nullis, indusiis semicupuliformibus, glabris, pallidis.

Szechuan orient., Chungking, Koo-loo Shan, leg. T. Y. Chow No. 844, VII, 1939.

24. **Microlepia neostrigosa** Ching, sp. nov.

Rhizomate late repente, 4 mm crasso, pilis atro-fuscis, patentibus, sat longis densissime oblecto; frondibus distantibus, stipite 34 cm longo, stramineo, ad basin 4 mm diametro, dense strigoso, sursum nudescente scabroque; lamina 45 cm longa, 22 cm lata, acuminata, bipinnata; pinnis ca. 16-jugis, obliquis, alternis, petiolatis (petiolo ca. 3 mm longo), lanceolatis, acuminatis, inferioribus vix abbreviatis, 4—5 cm inter se remotis, 14 cm longis, 4 cm latis, superioribus angustioribus, basi aequaliter late cuneatis, pinnatis; pinnulis ca. 17-jugis, contiguis, obliquis, sessilibus, 2—2.3 cm longis, 7 mm basi latis, parum decurrentibus, oblongo-lanceolatis, acutis, basi antice rectis, postice cuneatis, utroque ad dimidiam lobatis; lobis 4—5-jugis, anterioribus majoribus, oblongis, lateribus integris, apice acutis, saepe bifidis vel subintegris; nervis in lobis 2—3-jugis, simplicibus, obliquis, utrinque prominulis, parenchymate concoloribus; textura herbacea, colore in sicco viridi, paginis ad costas nervasque supra perparce et subtus dense pilis sat longis, pallidis, patentibus oblectis; soris parvis, 4—5-jugis pro pinnula ad sinum positis, indusiis semicupuliformibus, pallide brunneis, dense strigosis.

Yunnan austr., Se-song-ban-nan, Yunnan Complex Expedition No. 2536.

25. **Microlepia critica** Ching, sp. nov.

Rhizomate late repente, 4 mm crasso, pilis atro-brunneis, setaceis dense oblecto; frondibus distantibus, stipite ad 40 cm longo, 3—4 mm diametro, atro-brunneo, supra sulcato, infra tereti, ad basin iisdem pilis rhizomatis onusto, sursum nudescente et scabro; lamina ad 70 cm longa, 20—30 cm lata, oblonga, ad apicem elongatum acuminata, bipinnata; pinnis ultra 11-jugis, alternis, oblique patentibus, breviter petiolatis (petiolo 3 mm longo), lanceolatis, ad 20 cm longis, 3 cm basi latis, gradatim acuminatis, basi utrinque inaequalibus, latere anteriore rectis, inferiore cuneatis, pinnatis; segmentis 20-jugis, contiguis, subrhomboideo-oblongis, 1.8