

展,有柄(长5毫米),下部的长19厘米,宽7.5厘米,闊披針形,先端长漸尖,基部近圓形,几对称;小羽片达16对,密接,闊披針形,长4.3厘米,基部最宽,达1.6厘米,先端急尖,基部不对称,上側平截,下側稍狭,楔形,有短柄,略下延,一回羽状或羽状深裂;末回小羽片7对,接近,长圓形至倒卵形,圓头,基部上側一片最大,全緣或有一二浅缺刻,其余各片全緣。叶脉两面可见,羽状。叶草质,干后呈綠色,两面几光滑,仅沿叶脉有少数短毛疏生。孢子囊羣小形,在基部上側的一枚末回小羽片上5枚,其余各片一枚,着生在上緣的中部;囊羣盖杯形,棕色,疏被短毛。

产云南西北部(騰冲附近)。上緬甸也有。

与斜方鳞盖蕨 *Microlepia rhomboidea* (Wall.) Presl 最近,但本种小羽片为披針形,先端急尖或短漸尖。

31. 斜方鳞盖蕨(中国植物分类学报,第八卷)

Microlepia rhomboidea (Wall.) Presl, Tent. Pterid. (1836) 125; Prantl in Arb. Bot. Gart. Breslau I (1892) 31; Cop. Polyp. Philip. (1905) 56; Ching in Acta Phytotax. Sinica VIII (1959) 139——*Davallia rhomboidea* Wall. List (1828) n. 257; Kze. in Bot. Zeit. (1850) 158——*Microlepia trapeziformis* C. Chr. Ind. Fil. (1905), 428; Tard.-Blot et C. Chr. in Fl. Indo-Chine VII, ii (1939) 96; Holt. Fl. Mal. II, Ferns Mal. (1954) 313; Sledge in Kew Bull. No. 3 (1956) 526, pro parte——*Davallia strigosa* var *rhomboidea* Hook. et Bak. Syn. Fil. ed. 2 (1874) 99, pro parte.

植株高达1.4米。根状莖粗壮,直径5毫米,密被淡棕色长針状毛。叶远生;叶柄长68厘米,粗4毫米,基部被淡棕色长毛,向上脱落而有粗糙的痕和棕色疏短毛;叶片长圓形,长达72厘米,宽达40厘米,先端漸尖,基部縮狭,几为最宽处的一半,二回羽状或三回羽裂;羽片約15对,互生,下部的相距10厘米,开展,有柄(长5毫米),三角状长圓形或闊披針形,鐮刀状,长达25厘米,宽7厘米,先端长漸尖,基部近圓形,不对称,二回羽状深裂;小羽片9—12对,密接,几开展,有短柄(长不及1毫米),狭长圓形,长达4.5厘米,宽1.2—1.7厘米,先端圓鈍头,基部不对称,上側平截,下側楔形,略下延,末回小羽片或裂片长圓形,基部上側一片最大,先端鈍圓至近截形,全緣或上側有2—3个、下側有1—2个浅缺刻,无鋸齿。叶脉两面明显,在裂片上为羽状,細脉分叉。叶草质,干后呈綠色,两面主脉上疏被灰白色长針状毛;叶軸及羽軸密被棕色短毛。孢子囊羣小形,着生裂片基部,囊羣盖杯形,淡綠色,被灰白色疏毛。

产海南島、广西(凌云)、云南东南部。生长溪边林中,海拔1000米。广泛分布于印度北部、尼泊尔、緬甸、越南、南洋羣島、菲律宾。