

Jap. II (1929) t. 79; Wu, Wong et Pong in Bull. Dept. Biol. Sun Yatsen Univ. No. 3 (1932) 130, t. 56; Ching in Lingnan Sci. Journ. XII (1932) 570; C. Chr. et Tard.-Blot in Lecomte, Not. Syst. V (1936) 262; in Fl. Indo-Chine VII, ii (1939) 120; Tagawa in Acta Phytotax. et Geobot. VI (1937) 26, f. 1 A-C; H. Ito, Fil. Jap. Illustr. (1944) t. 16; Holt. Fl. Mal. II, Ferns Mal. (1954) 328, f. 188; 傅书遐, 中国主要植物图說(蕨类植物門) (1957) 49 頁, 61 图——*Adiantum cultratum* Willd. Phytogr. (1794) 14, t. 10, f. 2.

植株高 20 厘米, 少有达 30 厘米。根状茎横走, 直径 2 毫米, 栗色, 密被鳞片, 鳞片綫状钻形, 栗紅色。叶近生, 直立; 叶柄长 4—7 厘米, 有时达 13 厘米, 禾稈色或基部栗黑色, 有光泽, 仅基部有鳞片, 下边圓形, 上边有沟; 叶片綫状披針形, 长 10—14 厘米, 有时达 18 厘米, 寬 1.7—2 厘米, 少有达 2.2 厘米, 基部不变狭或稍狭, 先端漸尖, 一回羽状; 羽片 17—20—30 对, 互生, 开展, 有短柄, 下部各羽片稍远离, 中上部的接近, 对开式, 斜三角形, 长 8—9—(13) 厘米, 寬 5—6 厘米, 基部楔形, 先端鈍, 或近急尖, 下緣直, 近先端处上弯, 长 8—10 毫米, 內緣直, 闊 4—5 毫米, 上緣直或稍弯凸出, 有缺刻, 长 8—9 毫米。叶脉二叉分枝, 下面不显, 上面略显。叶草質, 干后綠色; 叶軸禾稈色, 光滑, 下面圓形, 上面有沟。孢子囊羣沿羽片上緣着生, 每缺刻有一个囊羣, 橫跨于 2—3 条小脉頂端; 囊羣盖橫綫形, 邊緣嚙蝕状。

产台湾、福建、江西、湖南、广东、广西、貴州、四川及云南。 分布于日本、越南、印度、緬甸和热带亚洲其他各地, 南达馬达加斯加及澳洲。

4. 狭叶陵齿蕨

Lindsaea changii C. Chr. Ind. Fil. Suppl. III (1934) 121——*Lindsaea minima* Ching in Sinensia I (1930) 52, non Cop. 1929.

植株高 18—19 厘米。根状茎短而横走, 被棕色綫状钻形鳞片。叶几为簇生; 叶柄长达 3 厘米, 褐紅色, 四稜, 仅基部有鳞片; 叶片长狭綫形, 长达 15 厘米, 中部寬 7—10 毫米, 向基部及先端漸狭, 一回羽状; 羽片 30—40 对, 互生, 开展, 有短柄, 基部各羽片远离, 常不育, 向上呈复瓦状排列, 对开式, 三角状卵圓形, 长 6 毫米, 寬 3—4 毫米, 基部楔形, 先端鈍圓, 下緣通直, 长 6 毫米, 內緣直, 闊 3 毫米, 上緣圓。叶脉二叉分枝, 下面略显, 上面不显。叶草質, 干后棕綠色; 叶軸暗棕色, 光滑, 有四稜。孢子囊羣沿羽片上緣及外緣着生, 每缺刻有一个囊羣, 橫跨于 2 条細脉頂端; 囊羣盖橫生, 同形, 棕綠色。

产江西, 詳細产地不明。