

緣平直，上緣弧形，有1—3个浅缺刻，或少为全緣，着生孢子囊羣。叶脉二叉分枝。叶薄膜質，上面深綠色，下面灰綠色；叶軸紅棕色或棕色，光滑，有四稜，上面有狹沟。孢子囊羣近邊緣着生，常断裂为2—4个橫生囊羣，或少有連續不断；囊羣盖近全緣或稍呈波状，狹，寬仅0.5毫米，其外緣距羽片邊緣稍远。

台湾南部特产。

7. 亮叶陵齒蕨 洛氏林蕨(中国蕨类植物图谱，第四卷)

Lindsaea lucida Bl. Enum. Pl. Jav. (1828) 216; Holt. in Gard. Bull. Str. Settl. IX (1934) 131; Tard.-Blot et C. Chr. in Fl. Indo-Chine VII, ii (1939) 122; Holt. Fl. Mal. II, Ferns Mal. (1954) 328, f. 187——*Lindsaea lobbiana* Hook. Sp. Fil. I (1846) 205, t. 62 C; C. Chr. Ind. Fil. Suppl. III (1934) 122; Ching, Ic. Fil. Sinic. IV (1937) t. 156——*Lindsaea crenulata* Fée, Gen. Fil. (1850—52) 105, t. 28, f. 2——*Lindsaea propria* v. A. v. R. in Bull. Jard. Bot. Buitenz. ser. 2, XVI (1914) 20.

植株高达40厘米。根状莖短而橫走，先端被棕色小鱗片。叶近生；叶柄长4—10厘米，禾稈色，有四稜，光滑；叶片綫状披針形，长20—30厘米，寬2—2.5厘米，一回羽状；羽片35—40对，下部各羽片远离，中上部的接近，但稀呈复瓦状，互生，开展，有短柄，对开式，近长方形，长1厘米，寬約6毫米，基部楔形，先端鈍圓，下緣平直，稍向上弯，內緣几直切，接近叶軸，上緣稍呈弧形，帶有2—4个浅缺刻，每裂片上橫生孢子囊羣1枚。叶脉二叉分枝，上面不显，下面明显。叶草質，干后为淡綠色，稍有光泽，叶軸禾稈色，有四稜，上面有狹沟，下面平或稍下凹。孢子囊羣中断为3—5个，囊羣盖狹，其外緣平直，寬不达羽片邊緣。

产海南島(南部及西南部)。生林下或溪边石上，海拔200—300米以下。越南、泰国、馬來亞至印度尼西亚也有分布。

8. 碎叶陵齒蕨

Lindsaea chingii C. Chr. Ind. Fil. Suppl. III (1934) 121——*Lindsaea chinensis* Ching in Sinensia I (1929) 5; Ic. Fil. Sinic. I (1930) t. 20, non Mett. 1868.

植株高14—26厘米。根状莖較短而橫走，直径約2毫米，密被鱗片，鱗片开展，暗棕色，有光泽，綫形，先端鈍，长1—1.5毫米。叶近生；叶柄长达9厘米，相距4—10毫米，細瘦，基部粗1毫米，圓筒形，暗栗色，有光泽，上部色渐淡，光滑；叶片三角状披針形，长10—16厘米，基部寬5.5厘米，中部寬1.2—1.8厘米，下部三分之一为二回羽状，上部三分之二为一回羽状，有时全体为一回羽状，向頂部逐漸变狹；羽片互生，开