

革质,半杯形,宽,与叶缘等长,近全缘或多少啮蚀,宿存。

产浙江南部、福建、台湾、安徽南部、江西、广东、海南岛、香港、广西、湖南、湖北、四川、贵州及云南。热带亚洲各地如日本、菲律宾、玻里尼西亚,向南至马达加斯加等地也有。生林下或灌丛中阴湿地,海拔 200—1900 米。

在云南南部红河流域,土名“蜈蚣参”,药用,价昂,据说有「起死回生」之效。

2. 阔片蕨 图版 XXIV, 7—9

Stenoloma biflorum (Kaulf.) Ching in Sinensia III (1933) 338; C. Chr. Ind. Fil. Suppl. III (1933) 173——*Davallia biflora* Kaulf. Enum. Fil. (1824) 221——*Microlepia biflora* Mett. Fil. Lips. (1856) 103——*Odontosoria biflora* C. Chr. Ind. Fil. (1905) 464; v. A. v. R. Handb. Mal. Ferns (1908) 259——*Odontosoria tsoongii* Ching in Bull. Fan Men. Inst. Biol. I (1930) 149——*Stenoloma littorale* Tagawa in Acta Phytotax. et Geobot. VI (1937) 224——*Stenoloma chusanum* var. *littorale* H. Ito in Bot. Mag. Tokyo LII (1938) 646; Fil. Jap. Illustr. (1944) t. 14.

植株高 30 厘米。根状茎粗壮,短而横走,密被赤褐色的钻状鳞片。叶近生;叶柄长达 18 厘米,禾秆色,有光泽,直径 2 毫米,下面圆,上面有纵沟,除基部外通体光滑;叶片三角状卵圆形,长 10—15 厘米,宽 6—10 厘米,先端渐尖,基部不变狭,三回羽状;羽片 10 对,除基部一对为近对生外,其余的为互生,密接,开展,有短柄(长 1—2 毫米),披针形,长 5.5 厘米,宽达 2.8 厘米,先端渐尖,基部不对称,下侧稍缩短;下部二回羽状;小羽片近菱状长圆形,长 1.5 厘米,宽 1 厘米,先端钝,基部楔形,下部羽状分裂成 1—2 对裂片;裂片近扇形,长 5 毫米,宽 3—4 毫米,先端有齿牙,基部楔形。叶脉不明显,每裂片上 4—6 枚,二叉分枝,叶近革质,干后棕褐色,通体光滑。孢子囊罩杯形,边缘着生,顶生于 1—2 条细脉上,每裂片上有 1—2 枚,囊罩盖圆形,革质,棕褐色。

产台湾、福建(厦门)及广东(阳江县,海陵岛,闸坡)。生海边石山上。

3. 线片蕨 图版 XXIV, 1—2

Stenoloma eberhardtii (Christ) Ching in Sinensia III (1933) 338; C. Chr. Ind. Fil. Suppl. III (1934) 338; Tard.-Blot et C. Chr. in Fl. Indo-Chine VII, ii (1939) 132, f. 16, 1—2.——*Odontosoria eberhardtii* Christ in Journ. de Bot. XXI (1908) 235, 236——*Lindsaea eberhardtii* Kramer, Rev. Gen. Lindsaea in the New World (1957) 135——*Lindsaea dissectiformis* Ching in Sinensia I (1930) 52.

植株高达 24 厘米。根状茎短而横走,被赤褐色的钻状长毛,叶近生或近丛生;柄长 5—9 厘米,铁丝状,纤细,粗 1 毫米,下部暗栗色,上部渐淡为禾秆色,有四棱,上面

