

本科植物主要供药用和提取芳香油。金粟兰的鲜花极香,用于熏茶。

分 属 检 索 表

1. 花两性,无花被;雄蕊 3 枚或 1 枚,着生于子房的一侧。
 2. 雄蕊 1 枚,棒状或卵圆状,花药 2 室;灌木……………1. 草珊瑚属 *Sarcandra* Gardn.
 2. 雄蕊 3 枚(稀 1 枚),下部或基部多少结合,中央 1 枚花药 2 室,侧生的为 1 室;通常为多年生草本……………2. 金粟兰属 *Chloranthus* Swartz
1. 花单性,雌花中有与子房贴生的 3 齿裂萼状花被;雄花具雄蕊 1 枚……………3. 雪香兰属 *Hedyosmum* Swartz

1. 草珊瑚属——*Sarcandra* Gardn.

Gardn. in Calcutta Journ. Nat. Hist. 6: 348. 1846; Swamy et
Bailey in Journ. Arn. Arb. 31: 127. 1950.

半灌木,无毛,木质部无导管。叶对生,常多对,椭圆形、卵状椭圆形或椭圆状披针形,边缘具锯齿,齿尖有一腺体;叶柄短,基部合生;托叶小。穗状花序顶生,通常分枝,多少成圆锥花序状;花两性,无花被亦无花梗;苞片 1 枚,三角形,宿存;雄蕊 1 枚,肉质,棒状至背腹压扁,花药 2 室(稀 3 室),药室侧向至内向,纵裂;子房卵形,含 1 颗下垂的直生胚珠,无花柱,柱头近头状。核果球形或卵形;种子含丰富胚乳,胚微小。

3 种,分布于亚洲东部至印度。我国有 2 种,产于西南部至东南部。

分 种 检 索 表

1. 叶革质,边缘具粗锯齿;雄蕊棒状,药室比药隔短,柱头近头状;果球形……………1. 草珊瑚 *S. glabra* (Thunb.) Nakai
1. 叶纸质,边缘具浅钝齿;雄蕊卵球状,药室几与药隔等长,柱头具小点;果卵形……………2. 海南草珊瑚 *S. hainanensis* (Poi) Swamy et Bailey

1. 草珊瑚(汝南圃史) 接骨金粟兰(通称),肿节风、九节风(江西),九节茶(浙江),满山香、九节兰(湖南),节骨茶(广西),竹节草,九节花,接骨莲,竹节茶 图版 25: 1—5

Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai, Fl. Sylv. Koreana 18: 17. t. 2. 1930; Swamy et Bailey in Journ. Arn. Arb. 31: 128. 1950; 中国科学院植物研究所,中国高等植物图鉴 1: 349. 图 697. 1972.——*Bladhia glabra* Thunb. in Trans. Linn. Soc. 2: 331. 1794.——*Ascaria serrata* Blume, Enum. Pl. Jav. 1: 79. 1827.——*Chloranthus brachystachys* Blume, Fl. Jav. Chloranth. 13. t. 2. 1829.——*Sarcandra chloranthoides* Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist. 6: 348. 1846.——*Chloranthus glaber* (Thunb.) Makino in Bot. Mag. Tokyo 26: 386. 1912.——*Chloranthus esquirolii* Lévl. Fl. Kouy-Tcheou 74. 1914.