

本变种与原种不同之处,主要为叶背面沿脉密被鳞屑状毛。花期5—6月。

产于云南、贵州。生于山坡草地或杂木林内,海拔1050—1600米。模式标本采自云南峨山。

8. 安徽金粟兰 黑细辛(安徽)

Chloranthus anhuiensis K. F. Wu in *Acta Phytotax. Sinica* 18(2): 222. 1980.

多年生草本,高32—50厘米;根状茎具多数细长须根,有香气;茎直立,单生或数个丛生,有5—7个明显的节,节间长0.7—2.5厘米,下部节上对生2片鳞状叶。叶对生,4片,有时为6片,生于茎上部,纸质,椭圆形至宽椭圆形,长10—13厘米,宽4—7厘米,顶端渐狭成长尖,基部宽楔形,边缘具细而密的锐锯齿,齿端有一腺体,背面无毛;侧脉6—7对;叶柄长0.7—2.5厘米;鳞状叶三角形,膜质。穗状花序数条,腋生和顶生,细弱,连总花梗长1.5—5.5厘米;苞片宽倒卵形;花小,排列稀疏,白色;雄蕊1枚,着生于子房上部外侧,药隔长圆形,长约0.7毫米,花药2室,药隔顶端不突出,与药室几等长;子房卵形,长约1毫米,无花柱,柱头近头状。核果倒卵形,具短柄。花期6—7月,果期8月。

产于安徽。生于山坡、沟边林下荫湿处,海拔500—700米。模式标本采自安徽九华山。

本种与 *Chloranthus serratus* (Thunb.) Roem. et Schult. 的区别在于:穗状花序腋生和顶生,细弱,花小,具1个雄蕊,药隔顶端不突出,与药室几等长。本种与 *Chloranthus multistachys* Pei 相近,但叶椭圆形,边缘具细而密的锐锯齿,背面无毛,穗状花序细弱,可以区别。

9. 天目金粟兰

Chloranthus tianmushanensis K. F. Wu in *Acta Phytotax. Sinica* 18(2): 221. 1980.

多年生、无毛草本,高20—26厘米;根状茎具多数淡黄色须根;茎直立,单生或数个丛生,有6—7个明显的节,节间长0.6—3.5厘米,下部节上对生2片鳞状叶,后期脱落。叶对生,6片生于茎上部,纸质,长圆形或宽椭圆形,长5—8厘米,宽3—5.5厘米,顶端突尖,基部阔楔形至钝圆,边缘具锯齿,齿端有一腺体;侧脉5—7对;叶柄长1—2厘米;鳞状叶膜质,宽卵形;托叶钻形。穗状花序从茎顶抽出,单一或二叉分枝,连总花梗长2.8—4厘米;苞片宽卵形;花白色;雄蕊3枚,3/4以下合生,着生于子房上部外侧,中央雄蕊有1个2室的花药,两侧雄蕊花药1室(偶有2室);药隔长圆形,中央药隔长约2毫米,与侧药隔等长或略长,药室在药隔中部;雌蕊具长4—7毫米的雌蕊柄;子房卵形,无花柱,柱头头状。果未见。花期5—6月。

产于浙江(西天目山)。生于山坡林下湿润处,海拔约1050米。模式标本采自浙江西天目山。

本种与 *Chloranthus serratus* (Thunb.) Roem. et Schult. 相近似,但本种叶