

治癩痢头、疔疮、毒蛇咬伤。有毒。

12a. 湖北金粟兰(秦岭植物志) 四叶七(陕西)

*Chloranthus henryi* Hemsl. var. *hupehensis* (Pamp.) K. F. Wu in *Acta Phytotax. Sinica* 18(2): 223. 1980. nov.——*Chloranthus hupehensis* Pamp. in *Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. ser.* 22: 272. f. 2. 1915.

本变种与原种不同之处在于：叶宽倒卵形或近圆形，边缘具粗圆齿，两面无毛；穗状花序顶生和腋生，总花梗较短，长2.5—5厘米。花期5—6月。

产于湖北、陕西、甘肃。生于山谷林下，海拔750—1950米。模式标本采自湖北。

根状茎或全草供药用。

13. 四川金粟兰 四块瓦、红毛七、四大天王(四川) 图版29: 1—6

*Chloranthus sessilifolius* K. F. Wu in *Acta Phytotax. Sinica* 18(2): 220. 1980.

多年生草本，高35—70厘米；根状茎粗壮，黄褐色，直径5—7毫米，生多数稍粗的须根；茎直立，较粗壮，单生或数个丛生，有4—5个明显的节，下部节上对生2片鳞状叶。叶无柄，对生，4片生于茎顶，呈轮生状，纸质，倒卵形或菱形，长12—20厘米，宽7—12厘米，顶端渐窄成长约2厘米的尖头，基部楔形，边缘具圆齿或锯齿，齿端有一腺体，背面淡绿色，有时带红紫色或仅叶脉带微红色；中脉和侧脉密被皮屑状鳞毛，侧脉6—8对，网脉两面稍凸起，明显；鳞状叶三角形，膜质，长7—13毫米。穗状花序自茎顶抽出，有2—4下垂的分枝，具长总花梗，长10—15厘米；苞片三角形，长约1.5毫米，边缘有不整齐的微齿；花白色；雄蕊3枚，基部分离或几分离，或稍相互覆盖，着生于子房外侧上部，中央雄蕊具1个2室的花药，药室在药隔的基部，侧生雄蕊各具1个1室的花药，药室在药隔的基部外缘，药隔长圆形，长2—2.5毫米，3药隔近等长；子房卵形，长约2毫米，无花柱，柱头截平，边缘有齿突。核果近球形，褐色，长2.5毫米，具长1.8毫米的柄。花期3—4月，果期6—7月。

产于四川。生于山坡林下荫湿处，海拔990—1200米。模式标本采自四川峨眉山。

本种与 *Chloranthus oldhami* Solms-Laub. 相近似，但本种叶无柄，宽倒卵形，顶端具长约2厘米的尖头，边缘具圆齿，背面脉上密被皮屑状鳞毛，总花梗长10—15厘米，雄蕊3枚，分离，药隔近等长，易于识别。

根供药用，为治跌打损伤良药。

13a. 华南金粟兰 图版29: 7—10

*Chloranthus sessilifolius* K. F. Wu var. *austro-sinensis* K. F. Wu in *Acta Phytotax. Sinica* 18(2): 220. 1980.——*Chloranthus oldhami* sensu Pei in *Sinensia* 6: 681. 1935; Pei et Shan in *Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China Bot. ser.* 10: 209. f. 21. 1938, non Solms-Laub.

本变种与原种不同之处为叶椭圆形，边缘具锐锯齿，总花梗较短，长4—9厘米，苞片通



1—6. 四川金粟兰. *Chloranthus sessilifolius* K. F. Wu: 1. 花枝; 2. 根和根状茎; 3. 花腹面观; 4. 花背面观; 5. 苞片; 6. 果。7—10 华南金粟兰 *Chloranthus sessilifolius* K. F. Wu var. *austrosinensis* K. F. Wu: 7. 花枝; 8. 花腹面观; 9. 花背面观; 10. 苞片。(余汉平绘)