

de, Rep. Beih. 93: 76. t. 25: 49. 1936.

灌木, 高2—6米。幼枝具疏长柔毛, 老时无毛, 黄褐色。芽长圆形, 黄红色, 无毛或近无毛, 常比叶柄长。叶披针形或长圆状披针形, 长1.4—4厘米, 宽5—12毫米, 最大者长可达5厘米, 宽2厘米, 先端急尖或渐尖, 基部圆形或宽楔形, 上面深绿色, 下面苍白色, 全缘; 叶柄长1—3毫米, 具疏柔毛。花序圆柱形, 长2.5—3厘米, 粗约6毫米, 密花, 轴被长柔毛; 花序梗明显, 具4小叶, 至果序时常脱落, 子房卵状长圆形, 近无柄, 无毛, 花柱很短, 柱头先端微裂; 腺体1, 腹生, 卵状长圆形; 苞片褐色, 倒卵状长圆形, 两面无毛。蒴果长圆形, 长约4毫米。雄株未见。花期4—5月, 果期5—6月。

产四川(灌县、宝兴)、甘肃等省。生于海拔1600—2000米间的山脊、山坡、或灌丛中。模式标本采自四川灌县。

73. 眉柳(秦岭植物志)

Salix wangiana Hao in Fedde, Rep. Beih. 93: 81. 1936; 秦岭植物志, 1(2): 39. 图25. 1974. — *S. rhododendroides* C. Wang et C. Y. Yu, 秦岭植物志, 1(2): 598. 1974.

73a. 眉柳(原变种) 图版50: 1—4

var. *wangiana*

灌木, 高2—3米。枝带黑色, 通常直立, 无毛。叶椭圆形或卵圆形, 稀倒卵圆形, 长3—5厘米, 宽2—3.2厘米, 先端钝, 稀圆形, 基部圆形或宽楔形, 两面无毛, 上面深绿色, 下面带白色, 边缘有疏细齿; 叶柄长5—12毫米, 无毛。花序有短梗, 雄花序长1—2.5厘米, 轴被长毛; 雄蕊2, 花丝长为苞片的2倍, 基部具长毛, 花药圆球形; 苞片长圆形或先端有2缺刻, 无毛; 腹腺棒状; 雌花序在果期长3—6厘米; 子房无柄, 椭圆状长圆形, 无毛, 花柱细, 长约1.5毫米, 柱头2, 苞片宽椭圆状长圆形, 两面无毛, 仅有腹腺。蒴果连宿存的花柱长6—8毫米。花期5月, 果期6月。

产陕西。多生于2650—3000米的山梁及山坡。模式标本采自太白山。

73b. 红柄柳(植物分类学报) 图版50: 5—6

var. *tibetica* C. Wang et C. F. Fang, 植物分类学报, 17(4): 103. 图3: 4—5. 1979; 西藏植物名录, 49. 1980.

与原变种的区别: 主要是具有腹腺和背腺; 叶柄长, 发红色。本变种的叶形变化较大, 先端急尖至圆钝, 边缘有细腺锯齿, 稀全缘。本变种叶形也与吉拉柳 *S. gilashanica* C. Wang et P. Y. Fu 极相似, 主要不同是子房、苞片全都没有毛。本变种又与迟花柳 *S. opsimantha* Schneid. 相近, 但植株和苞片等自幼无毛, 子房柄明显, 可区别。雄株未见。果期8月。

产我国西藏东部。多生于3100—4650米山坡灌丛中。模式标本采自察隅。

74. 腹毛柳(西藏植物名录)