

产云南西部。生山坡。模式标本采自景东县无量山(小地名:背娃娃山)。

本种与乌饭叶矮柳 *S. vaccinioides* Hand.-Mazz. 相似,不同为子房柄长,全株无毛,腺体比苞片短一倍,苞片无毛,无托叶等可区别。

本种雌花的结构与紫柳组 *Sect. Wilsonianae* Hao 相近,但习性,和其他形态特征殊属不同,未见雄株,暂列入本组,有待深入采集调查研究。

88. 藏甸柳 (植物分类学报)

Salix faxonianoides C. Wang et P. Y. Fu, 植物分类学报, 12 (2): 194. 图版 50: 2. 1974; 西藏植物名录, 46. 1980.

88a. 藏甸柳(原变种) 图版 53: 4—5

var. *faxonianoides*

矮小灌木,高约 40 厘米。枝平卧或上升,光滑,赤褐色或暗褐色。叶椭圆形或倒卵状椭圆形,有时近长圆形,先端尖或钝,基部圆形或楔形,上面绿色,下面苍白色,无毛,边缘有圆齿或圆锯齿。花序与叶同时展开,短圆柱形或椭圆形,着生于小枝的顶端,轴无毛;苞片宽椭圆形,两面无毛或稍有缘毛;雄蕊 2,花丝离生,无毛,花药紫红色,有背、腹腺,常 2—3 浅裂,或背腺 2 裂,稀不分裂;子房无柄,无毛,花柱 2 裂,柱头 2 浅裂,腺体 1—2,背腺有时 2 裂或缺,腹腺宽且长,有时 2 裂。蒴果狭卵形或卵形,长 5 毫米。花期 5 月,果期 5 月下旬—6 月中旬。

产西藏东部、云南西北部。生于海拔 3600—3700 米的山坡灌丛中。模式标本采自聂拉木。

88b. 毛轴藏甸柳(东北林学院植物研究室汇刊)

var. *vilosa* S. D. Zhao, 东北林学院植物研究室汇刊, 9: 7. 1980.

与原变种的区别为花序轴有疏柔毛。

产我国西藏东部。生于海拔 4000 米的高山灌丛中。模式标本采自墨脱。

89. 宝兴矮柳

Salix microphyta Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, ser. 2 (10): 83 (Pl. David. 2: 121). 1887; Burkill in Journ. Linn. Soc. 26: 531. 1899; Lévl. in Bull. Bot. France, 56: 299. 1909; Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 3: 62. 1916; Hao in Fedde, Rep. Beih. 93: 55. 1936.

矮小灌木,高 10—30 厘米,主干生根。枝直立或斜上,较细,幼枝红褐色;老枝暗褐色;当年生枝有柔毛,后变无毛。叶形多变化,卵形,倒卵形,长圆形或匙形,长 1—2 (3) 厘米,宽 8—13 (22) 毫米,上面深绿色,无毛,稍有光泽,叶脉凹下,下面淡绿色,无毛,叶脉微隆起,呈网状,边缘具明显内弯的圆腺齿;叶柄长达 1 厘米,无毛。花序与叶同时展开,在小枝上部侧生,基部具数枚小叶,叶常被散生长柔毛,轴被疏柔毛;雄花序长 2—4 厘米,雄蕊 2,花丝下部 1/3 被柔毛,花药卵球形,带红色;苞片倒卵形,无毛,先端近截形,仅具