

有短柄,花柱长约1毫米,上部2裂,柱头2裂;仅1腹腺,宽卵形,长约半毫米。果序长12厘米;蒴果长圆状卵形,有毛,有短柄。

产四川、湖北、陕西、甘肃等省。生于海拔1400—1600米地区。模式标本采自四川东部。

132b. 甘肃柳 (变种)

var. **kansuensis** (Hao) N. Chao, comb. nov.——*S. kansuensis* Hao in Fedde, Rep. Beih. 93: 61. t. 13: 28. 1936; 秦岭植物志, 1(2): 33. 1974.——*S. fargesii* auct. non Burkill; Seemen in Engl. Bot. Jahrb. 29: 277. 1900, et 36 (Beibl. 82): 30. 1905; Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 3: 47. 1916; Hao, l. c. 60. 1936.

与原变种的主要区别为:子房和果无毛。

产地与原变种相同。模式标本采自甘肃武都。

川鄂柳原纪载明确指出蒴果有毛,但 Seemen 两次根据同号模式标本却描写为蒴果无毛,后来不少著者都遵循 Seemen 的意见。根据大量标本,特别是四川东部(模式原产地)的标本,清楚地存在子房有毛和子房无毛的两个类型,而且两者经常混生在一起,因之我们认为,模式标本 A. Henry no. 5678 可能包含了两种不同的类型,应遵循原著者的意见。川鄂柳的子房和蒴果应是有毛的。

133. 银背柳 (西藏植物名录)

Salix ernesti Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 3: 47. 1916; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 77. 1929; Hao in Fedde, Rep. Beih. 93: 68. t. 18: 35. 1936; 西藏植物名录, 46. 1980.——*S. daltoniana* Anderss. var. *franchetiana* Burkill in Journ. Linn. Soc. 26: 528. 1899; Lévl. in Bull. Bot. France, 54: 298. 1909; Schneid. l. c. 115. 1916; Hao, l. c. 93. 1936, syn. nov.——*S. franchetiana* (Burkill) Hand.-Mazz. l. c. 67. 1927, syn. nov.——*S. pseudo-ernesti* Görz in Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. 6(1): 5. 1935, syn. nov.——*S. wangii* Görz, l. c. 11. 1935, syn. nov.

133a1. 银背柳 (原变型) 图版 66: 9—11

f. **ernesti**

灌木。小枝初被灰色皱曲长柔毛,后毛渐脱落。芽被长毛。叶椭圆形,倒卵状椭圆形,长达11厘米,宽达4厘米,先端圆,钝或急尖,基部圆形至楔形,上面特别是脉上被柔毛,下面被丝状绒毛,中脉和侧脉两面隆起,侧脉间距离约5毫米,全缘或上部具不明显的腺细齿;叶柄长达1厘米,被丝状长柔毛(雄株的枝、叶毛较少)。花与叶同时开放;花序长4—5厘米,雄花序粗达1厘米,雌花序较细,有花序梗,梗长1—3.5厘米,具正常叶,和轴均被皱曲长柔毛;苞片倒卵形或倒卵状长圆形,先端圆形,长2.5毫米,特别是外面被长柔