

- 毛.....154. 绵毛柳 *S. erioclada* Lévl.
 6. 小枝黑褐色, 叶椭圆形或椭圆状长圆形, 先端急尖或短渐尖, 基部楔形至近圆形, 两面无毛...
155. 异色柳 *S. dibapha* Schneid.
 5. 成叶下面浅绿色或粉绿色。
 7. 叶下面被绒毛或柔毛..... 153. 林柳 *S. driophila* Schneid.
 7. 叶下面仅脉上有毛, 其余无毛或近无毛..... 152. 九鼎柳 *S. amphibola* Schneid.

151. 丑柳

Salix inamoena Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 69. t. 1: 14, 15. 1929; Hao in Fedde, Rep. Beih. 93: 96. t. 38: 75. 1936.

151a. 丑柳(原变种) 图版 73: 5—9

var. *inamoena*

小灌木。小枝较细, 当年生枝有白色或淡黄色柔毛或绒毛, 后无毛。叶椭圆形, 长2—4.5 厘米, 宽1—2.2 厘米, 先端有小尖, 基部圆形, 上面亮绿色, 幼叶沿叶脉有黄色短柔毛, 下面浅绿色或发白, 有淡黄色或锈色柔毛, 脉上更明显, 侧脉6—8 对, 凸起, 网脉明显; 边缘有不明显的腺齿; 叶柄明显, 被锈毛。花序与叶同时开放, 圆柱形, 长约2—6 厘米, 直立斜出或稍弯曲, 花序梗短, 着生2—4 小叶; 雄花序粗3—5(7) 毫米; 雄蕊2, 花药近球形, 黄色, 花丝离生, 长2 毫米, 中部或达中部以上有柔毛; 苞片近圆形, 无毛或仅外面基部有短柔毛, 长1 毫米, 绿黄色或稍褐色; 背腺和腹腺各1, 短圆柱形; 子房卵形, 长1.5 毫米, 密被白色柔毛, 花柱短, 柱头浅2 裂; 苞片近圆形, 外面散生长柔毛, 内面无毛; 腺体1, 腹生。蒴果卵状长圆形, 长达4 毫米, 发褐红色。 花期4 月下旬。

产云南。生于路边、水沟边及潮湿山谷。模式标本采自昆明。

151b. 无毛丑柳(变种)

var. *glabra* C. F. Fang, var. nov. — *S. inamoena* × *tetradenia* Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 71. 1929.

本变种与原变种的区别是子房、苞片无毛。 花期4 月。

产云南。生于山坡或山谷。模式标本采自昆明。

152. 九鼎柳

Salix amphibola Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 3: 60. 1916; Hao in Fedde, Rep. Beih. 93: 62. t. 14: 27. 1936.

灌木。小枝多少被皱曲长柔毛。叶椭圆形或宽椭圆形, 长1.2—4 厘米, 宽0.7—1.7 厘米, 上面暗绿色, 特别是中脉上被淡黄灰色短柔毛, 下面粉绿色, 特别是中脉上被丝状长毛, 中脉在下面隆起, 侧脉约10 对, 网脉纹较明显, 全缘; 叶柄长约5 毫米, 被皱曲长柔毛。花序长达2.5 厘米, 粗4—5 毫米, 密花, 轴被毛, 花序梗长约5 毫米, 被长柔毛, 有正常叶; 苞片倒卵形或卵形, 长约1 毫米, 特别是上部边缘被丝状毛; 雄蕊2, 花丝离生, 基部被毛, 腹腺近卵形, 长约0.2 毫米; 子房或多或少被长柔毛, 无柄或近无柄, 花柱长约0.3 毫米,