

圆形或阔倒卵状椭圆形,或卵状椭圆形,长1.5—2.5厘米,宽0.7—1.0毫米,先端急尖或钝头,基部楔形,两面无毛,边缘有细锯齿;叶柄长5—7毫米;无托叶。花序生枝端,与叶同时开放,长1—2厘米,宽3—7毫米,花序梗有毛,基部有2小叶,多花,疏松;雄蕊2,花丝基部有毛;苞片倒卵圆形,淡黄色,先端紫红色,外面无毛,内面有疏毛,上缘有缘毛;腺体2;子房卵状圆锥形,有短柄,无毛,近无花柱,柱头2裂;苞片同雄花;腺体2,背生和腹生,长于子房柄4—5倍;果序长达5厘米。花期6—7月,果期7月。

产我国新疆。生于阿尔泰山高山冻原和天山高山带。海拔2600米以上。分布蒙古、苏联。

组 17. 越桔柳组——Sect. *Myrtilloides* Koeh. Deutsch. Dendrol. 89, 1893. —Group *Myrtilloides* Borr. ex Loud. Arbor. Frut. Brit. 3: 1587. 1838; 刘慎谔等,东北木本植物图志, 136, 1955.

生沼泽地小灌木,高约80厘米,分枝细。叶质薄,卵形、长圆状椭圆形至近圆形,两面不同色,常无毛,叶脉明显,干时变黑色。花序有梗,具叶;雄蕊2,花丝离生;子房无毛,有长柄,雌花和雄花只有1腹腺;苞片2色。

本组的模式种:越桔柳 *Salix myrtilloides* L.

本组我国产1种,2变种。

168. 越桔柳 (东北木本植物志)

*Salix myrtilloides* L. Sp. Pl. 1019. 1753; Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 3: 152. 1916; Hao in Fedde, Rep. Beih. 93: 87. 1936; Nas. in Kom. Fl. URSS, 5: 112. 1936; Rehd. Man. Cult. Trees and Shrubs ed. 2, 103. 1940; 刘慎谔等,东北木本植物图志, 156, 图版 43: 上 1—6; 图版 45: 64. 1955; 中国高等植物图鉴, 1: 368. 图 735. 1972; Kitag. Neo-Lineam. Fl. Mansh. 207. 1979.

168a. 越桔柳 (原变种) 图版 79: 1—4

var. *myrtilloides*

灌木,高达30—80厘米,直径2—3厘米。树皮灰色;一年生萌发枝黄色或赤褐色,无毛,幼枝无毛或有疏短柔毛。芽卵圆形,先端钝,无毛。叶椭圆形或长椭圆形,长1—3.5厘米,宽0.7—1.5厘米,先端钝或圆形,基部圆形,稀为广楔形,两面无毛,上面暗绿色或稍带紫色,下面带白色,叶干后变黑色,全缘,稀有齿;叶柄短,长2—4毫米,托叶小,披针形或卵形,有时无托叶。花序与叶同时开放;雄花序圆柱状,基部有数小叶;雄蕊2,花丝无毛;苞片椭圆形,绿色或黄绿色,先端发紫色,两面有疏长毛;腺体1,腹生,较发达,长约为苞片的1/2;雌花序卵形,基部有小叶;子房长圆形,有柄,柄长约为子房的1/3,无毛,花柱短,柱头2裂;苞片椭圆形,两面有疏毛;腺体1,腹生。花期5月,果期6月。

产黑龙江、吉林、辽宁。常生长在海拔300—500米的林区沼泽化草甸内成丛生长。分