

根据雌株分种检索表

1. 花序通常长 3—4(5) 厘米; 苞片常被金色长毛; 腺体先端常内卷 214. 川柳 *S. hylonoma* Schneid.
 1. 花序通常长 1.5—3.2 厘米; 苞片不被金色毛; 腺体先端不内卷。
 2. 花序梗上的叶先端渐尖; 叶形与正常叶近等大; 子房无柄 216. 玉皇柳 *S. yuhuangshanensis* C. Wang et C. Y. Yu
 2. 花序梗上的叶先端钝; 叶形比正常叶小, 果熟后脱落; 子房具短柄 215. 石泉柳 *S. shihsuanensis* C. Wang et C. Y. Yu
- (尚未见雄株: 玉皇柳 *S. yuhuangshanensis* C. Wang et C. Y. Yu; 石泉柳 *S. shihsuanensis* C. Wang et C. Y. Yu)

根据枝、叶分种检索表

1. 叶椭圆形, 长圆状披针形, 卵状披针形或卵形。
 2. 叶柄先端无腺点 214. 川柳 *S. hylonoma* Schneid.
 2. 叶柄先端有腺点 215. 石泉柳 *S. shihsuanensis* C. Wang et C. Y. Yu
1. 叶卵形或菱状卵圆形 216. 玉皇柳 *S. yuhuangshanensis* C. Wang et C. Y. Yu

214. 川柳(秦岭植物志)

Salix hylonoma Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 3: 68. 1916; Hao in Fedde, Rep. Beih. 93: 107. t. 41: 82, 1936; 秦岭植物志, 1 (2): 44, 1974. — *S. isochroma* Schneid. l. c. 122. 1916. — *S. chuniana* Fang in Journ. Wash. Acad. Sci. 38 (9): 314. 1948. — *S. hylonoma* Schneid. var. *isochroma* (Schneid.) Schneid. in Bot. Gaz. 64: 147, 1917; Hao, l. c. 107. 1936.

214a1. 川柳(原变型) 图版 98

f. *hylonoma*

小乔木, 高 3—6 米。幼枝有毛, 后无毛, 红棕色。叶芽三角状卵形, 先端微内弯。叶椭圆形, 长圆状披针形, 卵状披针形或卵形, 长 2.5—7(8.5) 厘米, 宽 1.5—2.3 厘米, 先端渐尖, 基部宽楔形至微心形, 上面绿色, 幼叶常呈现褐红色, 下面无毛或有毛, 稀绒毛, 幼叶常杂有金色柔毛, 浅绿色, 两面网脉明显, 边缘有不明显的细腺齿, 稀全缘。花与叶同时开放, 或稍先叶开放, 花序通常长 3—4(6) 厘米, 粗约 6 毫米, 呈现金色光泽, 几无花序梗; 雄蕊 2, 完全合生或仅花丝不同程度的合生, 基部有柔毛, 花药红紫色, 广椭圆形; 苞片椭圆形或倒卵形, 两面常有金色长毛; 腺体 1, 腹生, 狭圆柱形, 与苞片近等长; 雌花序长 5—7 厘米[果序可达 8(—12) 厘米], 粗 7 毫米; 子房卵形发红色, 无柄或有短柄, 有短柔毛, 花柱明显, 2 裂, 柱头 2 裂; 苞片、腺体同雄花。蒴果有短柄, 具疏柔毛, 长 4 毫米。

产云南西北部、四川、贵州、甘肃东南部、陕西、山西、河北、安徽西北部。生于海拔