

江、吉林、辽宁、河北、山西、山东、陕西、甘肃)…………… 7. 毛榛 *C. mandshurica* Maxim.

组 1. 刺榛组——Sect. 1. *Acanthochlamys* Spach in Ann. Sci. Nat. sér. 2. 16: 108. 1841; DC., Prodr. 16 (2): 129. 1864; Schneid. in Sarg., Pl. Wils. 2: 448. 1916; Bobr., Sav. Bot. 1: 27. 1936. subgen.

乔木或小乔木。果苞钟状，裂片硬化呈锐利的针刺状。

本组有下列 1 种 1 变种。

1. 刺榛 滇刺榛(中国森林树木图志) 图版 13: 1—2

*Corylus ferox* Wall., Pl. As. Rar. 1: 77. t. 87. 1830; DC., Prodr. 16 (2): 129. 1864; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 5: 625. 1888; H. Winkl. in Engler, Pflanzenreich 19 (IV-61): 44. fig. 13. 1904. Schneid., Ill. Handb. Laubholz. 2: 895. fig. 560 b. 561 c. 1912. et in Sarg., Pl. Wils. 2: 448. 1916; Rehd., Man. Cult. Trees and Shrubs ed. 2. 143. 1940; Hand-Mazz., Symb. Sinic. 7: 25. 1929; 胡先骕, 中国森林树木图志 2: 67. 图版 25. 1948; 中国高等植物图鉴 1: 395. 图 789. 1972.

刺榛(原变种)

*Corylus ferox* Wall. var. *ferox*


乔木或小乔木，高 5—12 米；树皮灰黑色或灰色；枝条灰褐色或暗灰色，无毛；小枝褐色，疏被长柔毛，基部密生黄色长柔毛，有时具或疏或密的刺状腺体。叶厚纸质，矩圆形或倒卵状矩圆形，很少宽倒卵形，长 5—15 厘米，宽 3—9 厘米，顶端尾状，基部近心形或近圆形，有时两侧稍不对称，边缘具刺毛状重锯齿，上面仅幼时疏被长柔毛，后变无毛，下面沿脉密被淡黄色长柔毛，脉腋间有时具簇生的髯毛，侧脉 8—14 对；叶柄较细瘦，长 1—3.5 厘米，密被长柔毛或疏被毛至几无毛。雄花序 1—5 枚排成总状；苞鳞背面密被长柔毛；花药紫红色。果 3—6 枚簇生，极少单生；果苞钟状，成熟时褐色，背面密被短柔毛，偶有刺状腺体，上部具分叉而锐利的针刺状裂片。坚果扁球形，上部裸露，顶端密被短柔毛，长 1—1.5 厘米。

产于西藏、云南、四川西部和西南部。生于海拔 2000—3500 米的山坡林中。锡金、尼泊尔也有。模式标本采自尼泊尔。

种子可食。

藏刺榛(变种)(中国森林树木图志)

*Corylus ferox* Wall. var. *thibetica* (Batal.) Franch. in Journ. de Bot. 13: 200. 1899; Burk. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 503. 1899; Diels in Engler, Bot. Jahrb. 29: 281. 1900; H. Winkl. in Engler, Pflanzenreich 19 (IV-61): 45. 1904. 中国高等植物图鉴 1: 395. 图 790. 1972.——*Corylus thibetica* Batal. in Acta



1—2. 刺榛 *Corylus ferox* Wall. var. *ferox*: 1. 叶与果序; 2. 坚果。3—4. 榛 *Corylus heterophylla* Fisch. var. *heterophylla*: 3. 叶与果序; 4. 坚果。5—6. 滇榛 *Corylus yunnanensis* A. Camus: 5. 叶与果序; 6. 坚果。7—8. 维西榛 *Corylus wangii* Hu: 7. 叶与果序; 8. 坚果。9—10. 华榛 *Corylus chinensis* Franch.: 9. 叶与果序; 10. 坚果。11—12. 毛榛 *Corylus mandshurica* Maxim.: 11. 叶与果序; 12. 坚果。(冯晋庸绘)